Инструкция по применению
Эринит-Фармапол Таблетки 10 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармапол-Волга
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пентаэритритила тетранитрат
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 10 мг

Описание

Таблетки белого цвета, слегка мраморные, двояковыпуклой формы.

Действующее вещество

Пентаэритритила тетранитрат

Состав

1 таблетка содержит эринита Таблеточной массы-гранул 0,25 г, в состав которой входит: эринита 0,01 г, вспомогательные вещества (крахмал картофельный, декстроза, тальк, кислота стеариновая, сахар).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика приступов стенокардии.

Способ применения и дозы

Внутрь (за 1 час до еды) по 10-20 мг (1-2 таблетки) 3-4 раза в сутки, при необходимости - до 40 мг 4 раза в сутки, допустимо назначение по 80 мг 2 раза в сутки. Для предупреждения ночных приступов стенокардии назначают по 20 мг перед сном. Курс лечения продолжается обычно 2-4 недели. Повторные курсы - по назначению врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату и другим органическим нитратам, выраженная артериальная гипотензия, коллапс, шок, острый инфаркт миокарда, протекающий с ортостатической гипотензией, геморрагический инсульт, черепно-мозговая травма, нарушение мозгового кровообращения (особенно геморрагический инсульт), закрытоугольная глаукома, беременность, период лактации, одновременный прием с ингибиторами фосфодиэстеразы, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Побочные действия

Аллергические реакции, головная боль, шум в ушах, головокружение, тошнота, слабость, тахикардия, повышенная утомляемость, тревожность, повышенное потоотделение, снижение артериального давления (АД), ортостатическая гипотензия, иногда наблюдается расстройство функции кишечника (диарея).

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме с другими лекарственными средствами посоветуйтесь с лечащим врачом. Под влиянием дигидроэрготамина возможно снижение антиангинального эффекта Эринита. Сочетание этих лекарственных средств считается нерациональным. Комбинация с пропранололом является рациональной, так как антиангинальное Действие Эринита усиливается. Этанол усиливает действие Эринита.

Особые указания

Для купирования приступов стенокардии препарат малопригоден в связи с медленным наступлением эффекта. Необходимо исключить в процессе лечения употребление этанола. При длительном применении возможно снижение терапевтического эффекта (вследствие развития толерантности). При применении препарата 1 раз в сутки в сочетании с другими антиангинальными средствами, риск развития толерантности снижается.

Срок хранения после открытия

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для