Инструкция по применению
Эриспирус Сироп 2 мг/мл 150 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Турция
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фенспирид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2 мг/мл



Описание

Прозрачная жидкость оранжево-красного цвета с вишневым запахом.

Действующее вещество

Фенспирид

Состав

1 мл сиропа содержит: действующее вещество: фенспирида гидрохлорид - 2,00 мг, вспомогательные вещества: сахароза - 600,00 мг, глицерин - 225,00 мг, краситель солнечный закат желтый (Е110) - 0,10 мг, калия сорбат - 1,90 мг, натрия сахаринат - 0,45 мг, ароматизатор вишневый - 1,20 мг, лимонной кислоты моногидрат1 - q.s., натрия гидроксид1 - q.s., вода - до 1 мл. 1 - для доведения pH до требуемого значения (pH= 5,0).

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

После приема внутрь максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови достигается через 2,3±2,5 ч (от 0,5 до 8 ч). Выводится в основном почками, период полувыведения (T1/2) составляет 12 ч.

Показания

Заболевания верхних и нижних дыхательных путей: ринофарингит и ларингит, трахеобронхит, бронхит (на фоне хронической дыхательной недостаточности или без нее), бронхиальная астма (в составе комплексной терапии), респираторные явления (кашель, осиплость голоса, першение в горле) при кори, коклюше, гриппе, инфекционные заболевания дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, когда показана стандартная терапия антибиотиками, синусит и отит различной этиологии.

Способ применения и дозы

Необходимо строго следовать рекомендации врача. Внутрь, перед едой. Перед употреблением взбалтывать. Взрослые: от 3 до 6 столовых ложек сиропа (45-90 мл) в сутки. Дети от 2 до 16 лет: масса тела больше 10 кг: 2-4 столовые ложки (30-60 мл) в сутки. масса тела меньше 10 кг: 2-4 чайные ложки (10-20 мл) в сутки. Можно добавлять в бутылочку с питанием. Продолжительность терапии определяется врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к фенспириду и другим компонентам препарата, беременность, период лактации, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 2 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Прием препарата во время беременности не рекомендуется. Терапия фенспиридом не является основанием для прерывания наступившей беременности. Клинические данные о фетотоксическом действии фенспирида или его способности вызывать пороки развития при приеме во время беременности отсутствуют. Неизвестно, проникает ли Фенспирид в грудное молоко. При необходимости применения препарата в период лактации, необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нежелательные реакции классифицированы в соответствии с их частотой развития следующим образом: очень часто (>1/10), часто (>1/100,1/1000,1/10000, Со стороны центральной нервной системы редко: сонливость, частота неизвестна: головокружение. Со стороны сердечно-сосудистой системы редко: умеренная синусовая тахикардия, выраженность которой уменьшается при снижении дозы препарата, частота неизвестна: ощущение сердцебиения, гипотензия, возможно связанная с тахикардией. Со стороны желудочно-кишечного тракта часто: желудочно-кишечные расстройства, тошнота, боль в эпигастральной области, частота неизвестна: диарея, рвота. Со стороны кожи и подкожных тканей редко: эритема, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, фиксированная пигментная эритема, частота неизвестна: кожный зуд, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона. Прочее частота неизвестна: астения, повышенная утомляемость.

Передозировка

При передозировке препарата (отмечены случаи передозировки при приеме препарата в дозе более 2320 мг) следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Симптомы: сонливость или возбуждение, тошнота, рвота, синусовая тахикардия. Лечение: симптоматическая терапия, промывание желудка, мониторинг электрокардиограммы (ЭКГ). Поддержание важных функций организма.

Взаимодействие с другими препаратами

Из-за возможного седативного эффекта при приеме блокаторов гистаминовых Н1-рецепторов не рекомендуется применение препарата в комбинации с лекарственными средствами, обладающими седативным эффектом. Не рекомендуется одновременное применение препарата с алкоголем.

Особые указания

В случае возникновения инфекций дыхательной системы, вызванной бактериями или грибками, Фенспирид рекомендуется назначать только в сочетании с антибактериальной и противогрибковой терапией. Указание для пациентов с сахарным диабетом: 1 столовая ложка сиропа содержит 0,9 ХЕ. Специальные меры предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного препарата Нет необходимости в специальных мерах предосторожности при уничтожении неиспользованного препарата Эриспирус,.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Исследований по изучению влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами не проводилось. Пациенты должны быть осведомлены о возможном развитии сонливости при приеме препарата, особенно в начале терапии или в сочетании с приемом алкоголя. Необходимо соблюдать осторожность при работе с транспортными средствами, механизмами.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.