Инструкция по применению
Эрсефурил Капсулы 200 мг 14 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нифуроксазид
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 60.0



Действующее вещество

Нифуроксазид

Состав

Действующее вещество: НифуроксазидВспомогательные вещества: Сахароза 72.0 мг, Магния стеарат 1.8 мг, Кукурузный крахмал 88.0 мгКонцентрация действующего вещества (мг): 200 мг

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Нифуроксазид практически не абсорбируется из ЖКТ, 99% принятой дозы остается в кишечнике и оказывает там свое противомикробное действие. Нифуроксазид выводится через кишечник: 20% в неизмененном виде, а остальное количество нифуроксазида - химически измененным.

Показания

Острая бактериальная диарея.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым - по 1 капе. 4 раза в день (800 мг). Детям старше 6 лет по 200 мг 3 раза в сутки (600 мг). Продолжительность курса лечения - не более 7 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность (в т.ч. к др. производным нитрофурана); детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

В исследованиях на животных у нифуроксазида не было выявлено тератогенного эффекта. Однако в качестве меры предосторожности принимать нифуроксазид при беременности не рекомендуется (недостаточный клинический опыт применения при беременности).Во время периода лактации возможно продолжение грудного вскармливания в случае короткого курса лечения препаратом.

Побочные действия

Крайне редко возможны аллергические реакции, такие как кожные высыпания, крапивница, отек Квинке или анафилактический шок.

Передозировка

Данных по передозировке препарата Эрсефурил не имеется.

Взаимодействие с другими препаратами

Данных по лекарственному взаимодействию препарата Эрсефурил не имеется.

Особые указания

В случае бактериальной диареи с признаками системного поражения (ухудшение общего состояния, повышение температуры тела, симптомы интоксикации или инфекции) следует применять антибактериальные препараты с хорошей системной диффузией.В случае выраженной, продолжительной диареи, тяжелой рвоты или при отказе от еды следует рассмотреть вопрос о внутривенном введении жидкости и электролитов для регидратации.Если на фоне лечения диарея сохраняется более 2 дней, следует пересмотреть лечение и рассмотреть вопрос о необходимости приема жидкостей и электролитов внутрь или их в/в введения. Объем вводимой жидкости и способ ее введения (внутрь, в/в) должен соответствовать степени выраженности диареи, возрасту и клиническому состоянию пациента.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПрепарат не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами или занятия другими потенциально опасными видами деятельности.

Условия хранения

В сухом месте