Инструкция по применению
Эрсефурил Капсулы 200 мг 28 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нифуроксазид
Количество в упаковке: 28
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Нифуроксазид

Состав

1 капс. активное вещество нифуроксазид. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 88 мг, сахароза - 72 мг, магния стеарат - 1.8 мг. Состав корпуса капсулы: желатин - до 100%, титана диоксид (Е171) - 2%, краситель железа оксид желтый (Е172) - 0.6286%.Состав крышечки капсулы: желатин - до 100%, титана диоксид (Е171) - 2%, краситель железа оксид желтый (Е172) - 0.6286%.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Практически не всасывается и действует в просвете кишечника

Показания

Острая бактериальная диарея, протекающая без ухудшения общего состояния, повышения температуры тела, интоксикации (в дополнение к адекватной тяжести диареи регидратации путем приема жидкости и электролитов внутрь или, при необходимости, их в/в введения).

Способ применения и дозы

Препарат предназначен только для приема внутрь для взрослых или детей в возрасте старше 6 лет.Взрослые: по 4 капсулы (800 мг) в сутки, разделенные на 2-4 приема. Дети старше 6 лет: по 3-4 капсулы (600-800 мг) в сутки, разделенные на 2-4 приема. Продолжительность курса лечения: не более 7 дней

Противопоказания

Повышенная чувствительность к производным нитрофурана или любым вспомогательным веществам препарата;— детский возраст до 6 лет;— беременность; — непереносимость фруктозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточность сахаразы и изомальтазы (из-за наличия в составе препарата сахарозы)

Применение при беременности и кормлении грудью

В исследованиях на животных у нифуроксазида не было выявлено тератогенного эффекта. Однако в качестве меры предосторожности принимать нифуроксазид при беременности не рекомендуется (недостаточный клинический опыт применения при беременности).Во время периода лактации возможно продолжение грудного вскармливания в случае короткого курса лечения препаратом

Побочные действия

Аллергические реакции: возможно - кожные высыпания, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок

Передозировка

Данных по передозировке препарата Эрсефурил не имеется

Взаимодействие с другими препаратами

Данных по лекарственному взаимодействию препарата Эрсефурил не имеется

Особые указания

В случае бактериальной диареи с признаками системного поражения (ухудшение общего состояния, повышение температуры тела, симптомы интоксикации или инфекции) следует применять антибактериальные препараты с хорошей системной диффузией. В случае выраженной, продолжительной диареи, тяжелой рвоты или при отказе от еды следует рассмотреть вопрос о внутривенном введении жидкости и электролитов для регидратации.Если на фоне лечения диарея сохраняется более 2 дней, следует пересмотреть лечение и рассмотреть вопрос о необходимости приема жидкостей и электролитов внутрь или их в/в введения. Объем вводимой жидкости и способ ее введения (внутрь, в/в) должен соответствовать степени выраженности диареи, возрасту и клиническому состоянию пациента. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПрепарат не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами или занятия другими потенциально опасными видами деятельности

Условия хранения

Беречь от детей