Инструкция по применению
Эрвы шерстистой трава 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Трава измельченная
Страна: Россия
Производитель: Здоровье
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эрвы шерстистой трава
Количество в упаковке: 1



Описание

Измельченное сырье. Кусочки соцветий, листьев, стеблей и корней, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 5 мм. Цвет беловато-серый с отдельными зелеными кусочками листьев. Запах слабый. Вкус водного извлечения горький с ощущением слизистости Диуретическое средство растительного происхождения. Трава эрвы шерстистой содержит флавоноиды, стерины, фенолокислоты, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества. Настой травы эрвы шерстистой оказывает диуретическое, а также умеренное противовоспалительное действие. При этом отмечено выведения ионов натрия и кальция и, в некоторой степени, ионов калия. При применении препарата отмечается также тенденция к снижению содержания мочевины в сыворотке крови.

Действующее вещество

Эрвы шерстистой трава

Состав

Эрвы шерстистой трава (Aervae lanatae herba).

Форма выпуска

Трава измельченная

Показания

В составе комплексной терапии у взрослых в качестве диуретического средства при умеренно выраженном отечном синдроме, инфекционно-воспалительных заболеваниях почек (пиелонефрит).

Способ применения и дозы

Около 5 г (1 столовую ложку) травы эрвы шерстистой помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут, затем охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.Возможно приготовление настоя в термосе: 5 г сырья заливают 200-250 мл крутого кипятка и настаивают в течение 1 часа.Принимают внутрь в теплом виде по 1/4-1/2 стакана 2-3 раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения от 10 до 30 дней.Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Остеопороз, заболевания, сопровождающиеся повышенным выведением кальция из организма, в том числе гипопаратиреоз, рахит, почечная остеодистрофия. Беременность, период лактации, детский возраст (до 18 лет).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, тошнота.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.Приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.