Инструкция по применению
Эслидин Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фосфолипиды+Метионин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 100 мг+300 мг
Срок годности: 24

Действующее вещество

Фосфолипиды+Метионин

Состав

Одна капсула содержит: липоид ППЛ-400 (фосфолипиды) (в пересчете на 100 % содержание полиненасыщенных фосфолипидов из соевого лецитина – фракция PPL) 300 мг, метионин (в пересчете на 100 % вещество) 100 мг, масло соевое до 550 мг. Капсулы твердые желатиновые: титана диоксид, железа оксид черный, железа оксид красный, железа оксид желтый, очищенная вода, желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Препарат применяется в гастроэнтерологии, дерматологии, неврологии, кардиологии. Гастроэнтерология: Жировая дистрофия печени различной этиологии, острый и хронический гепатит (кроме вирусного), цирроз печени, токсическое поражение печени – алкогольное, наркотическое, лекарственное, нарушение функции гепатоцитов (как осложнение при других заболеваниях), пред- и послеоперационное лечение при операциях в области гепатобилиарной зоны. Дерматология: Псориаз в составе комплексной терапии. Неврология: Атеросклероз сосудов головного мозга в составе комплексной терапии. Эндокринология: Сахарный диабет в составе комплексной терапии, истощение, дистрофия. Кардиология: Атеросклероз коронарных артерий в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, во время еды, проглатывая целиком, с достаточным количеством воды. При заболеваниях печени, атеросклерозе коронарных артерий и сосудов головного мозга, сахарном диабете, дистрофии и истощении принимать по 2 капсулы 3 раза в день. Рекомендуемый курс лечения – 3 месяца, минимальный – 1 месяц. При псориазе - по 2 капсулы 3 раза в день. Рекомендуемый курс лечения – 2 недели. Детям старше 7 лет при заболеваниях печени, сахарном диабете, жировой дистрофии печени – по 2 капсулы 3 раза в день, в течение 1 - 3 месяцев. При псориазе детям старше 7 лет – по 2 капсулы 3 раза в день, в течение 2 недель. Применение препарата у детей от 3 до 7 лет – по 1 капсуле 3 раза в день, в течение 1-3 месяцев.

Противопоказания

Гиперчувствительность (повышенная чувствительность) к компонентам препарата, тяжелая печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия, вирусный гепатит, детский возраст до 3 лет. С осторожностью возможно применение в период беременности и у детей от 3 до 7 лет, а также при почечной недостаточности (из-за опасности нарастания гиперазотемии).

Применение при беременности и кормлении грудью

Исследований подтверждающих безопасность Эслидина® для плода и безопасность для ребенка во время кормления грудью не проводилось. Применение препарата при беременности и в период лактации возможно только по назначению врача в случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

При случайном превышении суточной дозы в несколько раз возможно снижение артериального давления, усиление частоты сердечных сокращений (пульса), дезориентация. Лечение: симптоматическое (под врачебным контролем).

Условия хранения

Беречь от детей