
Инструкция по применению
Эсперавир Капсулы 200 мг 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Биохимик
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Молнупиравир
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 200 мг



Описание

Препарат Эсперавир содержит действующее вещество молнупиравир, относящееся к группе противовирусных средств прямого действия, и применяется для лечения гриппа и/или острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), а также новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Действующее вещество

Молнупиравир

Состав

Действующим веществом является молнупиравир.Каждая капсула содержит 200 мг молнупиравира. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, повидон К30, натрия стеарилфумарат. Корпус и крышечка капсулы: титана диоксид (Е171), желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Молнупиравир подавляет размножение вируса за счет нарушения работы вирусного фермента (РНК-полимеразы). Это приводит к быстрой элиминации (выведению) вируса из организма, уменьшению продолжительности симптомов заболевания, ускорению выздоровления и снижению рисков возникновения осложнений вирусных инфекций. Молнупиравир не оказывает влияния на клетки человека, поскольку вирусный фермент РНК-полимераза в них отсутствует. В исследованиях молнупиравир показал противовирусную активность в отношении наиболее часто встречающихся респираторных вирусов человека, включая вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа, риновирус человека, а также коронавирусы.Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Показания

Препарат Эсперавир применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения: – гриппа и/или ОРВИ; – новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденной результатами диагностического теста SARS-CoV-2, легкого и среднетяжелого течения у пациентов, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения и не требующих дополнительной оксигенотерапии (процедуры восполнения дефицита кислорода в организме).

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.Начало лечения гриппа и/или ОРВИНачинайте прием препарата Эсперавир как можно раньше после постановки диагноза гриппа и/или ОРВИ, но для достижения наилучшего результата не позднее 48 часов после появления симптомов заболевания.Начало лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)Начинайте прием препарата Эсперавир как можно раньше после постановки диагноза новой коронавирусной инфекции (COVID-19), но не позднее 5 дней после появления первых симптомов заболевания. Рекомендуемая доза:Принимайте препарат Эсперавир по 4 капсулы дозировкой 200 мг или по 2 капсулы дозировкой 400 мг 2 раза в сутки (каждые 12 часов).Разовая доза препарата составляет 800 мг. Суточная доза составляет 1600 мг.Путь и (или) способ введения• Принимайте внутрь данный препарат независимо от приема пищи.• Проглатывайте капсулу целиком, запивая водой, не разжевывая.• Не вскрывайте и не разламывайте капсулу.Продолжительность терапииПродолжительность курса лечения – 5 суток.Если Вы приняли препарата Эсперавир больше, чем следовалоЕсли Вы считаете, что приняли препарата Эсперавир больше, чем следовало, сообщите об этом врачу или обратитесь в больницу. Возьмите с собой упаковку препарата.Если Вы забыли принять препарат Эсперавир• Если какая-либо доза препарата Эсперавир была пропущена и опоздание в приеме составило меньше 10 часов от назначенного времени приема, то следующую дозу следует принять как можно скорее и затем возобновить обычный режим дозирования.• Если какая-либо доза препарата Эсперавир была пропущена и опоздание в приеме составило больше 10 часов от назначенного времени приема, то пропущенную дозу принимать не следует. Следующую дозу нужно принять в обычное время.• Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.Если Вы прекратили прием препарата ЭсперавирСледует продолжать курс лечения до тех пор, пока Ваш врач не скажет прекратить его.При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Эсперавир:• если у Вас аллергия на молнупиравир или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);• если Вы беременны или планируете беременность;• если Вы кормите грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.КонтрацепцияЕсли Вы женщина детородного возраста, используйте надежные методы контрацепции (презерватив со спермицидом) во время лечения препаратом и после его окончания в течение 4 дней. Если Вы мужчина, который может стать отцом ребенка, Вы должны использовать надежные методы контрацепции во время приема препарата и в течение 3 месяцев после его окончания.БеременностьНе принимайте препарат Эсперавир во время беременности, так как действие молнупиравира при беременности не изучалось. Избегайте наступления беременности во время приема препарата Эсперавир.Если Вы забеременели во время лечения препаратом Эсперавир, сообщите об этом врачу.При назначении препарата Эсперавир женщинам, способным к деторождению (в том числе в постменопаузе менее 2-х лет), необходимо подтвердить отрицательный результат теста на беременность до начала лечения.Повторный тест на беременность необходимо провести после окончания приема лекарственного препарата.Грудное вскармливаниеНе кормите грудью во время приема и в течение 4 дней после последней дозы лекарственного препарата Эсперавир. Неизвестно, проникает ли молнупиравир в грудное молоко.Если Вы кормите грудью или планируете кормить грудью, сообщите об этом врачу.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Эсперавир может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.Прекратите прием препарата Эсперавир и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции (реакции гиперчувствительности/ангионевротический отек), могут возникать нечасто – не более чем у 1 человека из 100:• затрудненное дыхание или глотание;• свистящие хрипы;• отек лица, губ, языка или горла;• сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей (крапивница).Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Эсперавир.Часто – могут возникать не более чем у 1 человека из 10:• головная боль;• головокружение;• частый жидкий стул (диарея);• тошнота.Нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100:• рвота;• сыпь;• крапивница.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе безрецептурные лекарственные препараты, такие как витамины или лекарственные препараты растительного происхождения.

Особые указания

Перед приемом препарата Эсперавир проконсультируйтесь с лечащим врачом. Сообщите лечащему врачу прежде, чем начать прием препарата Эсперавир, если:• Ваш возраст больше 60 лет;• у Вас ожирение (индекс массы тела (ИМТ) > 30 кг/м2); • у Вас сахарный диабет;• у Вас хроническая болезнь почек, тяжелая степень почечной недостаточности;• у Вас тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы;• у Вас хроническая обструктивная болезнь легких;• у Вас активные злокачественные новообразования;• у Вас нарушение функции печени.Это важно для того, чтобы врач в полной мере смог оценить, насколько безопасно назначать Вам данный препарат и потребуется ли соблюдение особых мер предосторожности. Сообщите врачу, если при приеме препарата у Вас развивается: кожная сыпь, зуд, отеки век, губ, гортани, головокружение или затрудненное дыхание, которые могут быть симптомами гиперчувствительности (аллергии). При их возникновении необходимо прекратить прием молнупиравира и начать прием соответствующих препаратов и/или поддерживающую терапию.

Условия хранения

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до».Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.Хранить при температуре не выше 25 °C. Хранить в оригинальной упаковке (пачке) для защиты от света.Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.