Инструкция по применению
Эсперавир капсулы 400 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Промомед
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Молнупиравир
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 400 мг
Срок годности: 24



Описание

Противовирусный препарат на основе молнупиравира для лечения гриппа, ОРВИ и COVID-19 (лёгкое и среднетяжёлое течение). Применяется у взрослых с 18 лет. Подавляет размножение вируса, ускоряет выздоровление.

Действующее вещество

Молнупиравир

Состав

Действующее вещество: молнупиравир 400 мг. Вспомогательные: целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, повидон К30, натрия стеарилфумарат. Корпус капсулы: титана диоксид (Е171), желатин. Крышечка: титана диоксид (Е171), желатин, индигокармин (Е132).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Лечение гриппа и/или ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лёгкого и среднетяжёлого течения у взрослых с 18 лет, в т.ч. с риском прогрессирования.

Способ применения и дозы

Принимайте внутрь по 4 капсулы по 200 мг или по 2 капсулы по 400 мг 2 раза в сутки (каждые 12 часов). Разовая доза — 800 мг, суточная — 1600 мг. Курс — 5 суток. Начинать лечение как можно раньше: при гриппе/ОРВИ — не позднее 48 ч от симптомов; при COVID-19 — не позднее 5 дней. Капсулы проглатывать целиком, запивая водой, независимо от еды.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам, беременность, грудное вскармливание, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания. Женщинам детородного возраста необходимо использовать надёжную контрацепцию во время лечения и 4 дня после. Мужчинам — контрацепция в течение 3 месяцев после окончания приёма.

Побочные действия

Часто (≥1/100 – <1/10): головная боль, головокружение, диарея, тошнота. Нечасто (≥1 /1000 – <1/100): рвота, сыпь, крапивница. При появлении признаков аллергии (затруднённое дыхание, отёк лица, сильный зуд) немедленно обратиться за помощью.

Передозировка

При приёме дозы больше рекомендуемой сообщите врачу. Симптомы передозировки не описаны. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите врачу о всех принимаемых препаратах. Взаимодействие с другими ЛС не установлено.

Особые указания

С осторожностью при возрасте >60 лет, ожирении, сахарном диабете, хронической болезни почек, тяжёлых ССЗ, ХОБЛ, онкозаболеваниях, нарушении функции печени. При появлении аллергии (сыпь, отёки, затруднение дыхания) прекратить приём и обратиться к врачу. Во время лечения воздержитесь от вождения транспорта.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C, в оригинальной упаковке для защиты от света, в недоступном для детей месте.