Инструкция по применению
Эспумизан Капсулы 40 мг 25 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: Berlin-Chemie
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Симетикон
Количество в упаковке: 25
Дозировка действующего вещества: 40 мг
Срок годности: 36



Действующее вещество

Симетикон

Состав

В 1 капсуле содержится: Действующее вещество: симетикон - 40,0 мг; Вспомогательные вещества: желатин - 22,47 мг, глицерол 85 % - 9,67 мг, метилпарагидроксибензоат - 0,28 мг, краситель хинолиновый желтый, Е 104 - 0,10 мг, краситель солнечный закат желтый, Е 110 - 0,0024 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Симетикон химически инертен, после перорального приема не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и действует только в его просвете. Не влияет на ферменты и микроорганизмы, присутствующие в ЖКТ. Выводится в неизменном виде.

Показания

\- избыточное образование и скопление газов в ЖКТ (метеоризм, синдром Ремхельда, аэрография, повышенное газообразование в послеоперационном периоде); - подготовка к диагностическим процедурам органов брюшной полости и малого таза (ультразвуковые, рентгенологические исследования и др.); - симптомы избыточного газообразования, вызванного функциональной диспепсией; - острые отравления моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества (в качестве пеногасителя).

Способ применения и дозы

При жалобах, связанных с избыточным газообразованием: Взрослым по 2 капсулы 3-5 раз в сутки, можно с небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и при необходимости перед сном. Продолжительность курса лечения зависит от наличия симптомов повышенного газообразования. При необходимости препарат Эспумизан® можно применять в течение длительного периода времени. Подготовка к диагностическим исследованиям: по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования, и утром в день исследования 2 капсулы, не запивая водой. В качестве пеногасителя при отравлениях моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества: разовая доза для взрослых составляет 10 - 20 капсул, дозирование зависит от тяжести интоксикации. Педиатрическая популяция Препарат Эспумизан противопоказан у детей в возрасте до 18 лет. Другие лекарственные формы и дозировки могут удовлетворять потребности данной группы

Противопоказания

\- повышенная чувствительность к компонентам препарата; \- кишечная непроходимость; \- детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Эспумизан можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Побочных эффектов при приеме препарата Эспумизан не наблюдалось.; Возможно развитие аллергических реакций на компоненты препарата.

Передозировка

Передозировка препарата Эспумизан маловероятна из-за химической и физиологической инертности препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия препарата Эспумизан с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания

У людей с повышенной чувствительностью к компонентам препарата (метилпарагидроксибензоат и краситель хинолиновый желтый) возможно возникновение реакций гиперчувствительности немедленного типа, а также реакций гиперчувствительности замедленного типа. При возникновении любых аллергических реакций прием препарата следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.; Влияние на способность к управлению автотранспорта и работу с механизмами; Препарат Эспумизан не оказывает влияния на быстроту психомоторных реакций и способность к восприятию или оценки ситуации.

Условия хранения

Беречь от детей