Инструкция по применению
Эспумизан Капсулы 40 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: Berlin-Chemie
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Симетикон
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 40 мг
Срок годности: 36



Действующее вещество

Симетикон

Состав

1 капсула содержит: Активные вещества: симетикон 40 мг; Вспомогательные вещества: желатин - 22,47 мг, глицерол 85% - 9,67 мг, метилпарагидроксибензоат - 0,28 мг, краситель хинолиновый желтый (Е104) - 0,1 мг, краситель солнечный закат желтый (Е110) - 0,0024 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Способ применения и дозы

При жалобах, связанных с избыточным газообразованием: Взрослым по 2 капсулы 3-5 раз в сутки, можно с небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и при необходимости перед сном. Продолжительность курса лечения зависит от наличия симптомов повышенного газообразования. При необходимости препарат Эспумизан® можно применять в течение длительного периода времени. Подготовка к диагностическим исследованиям: по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования, и утром в день исследования 2 капсулы, не запивая водой. В качестве пеногасителя при отравлениях моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества: разовая доза для взрослых составляет 10 - 20 капсул, дозирование зависит от тяжести интоксикации. Педиатрическая популяция Препарат Эспумизан противопоказан у детей в возрасте до 18 лет. Другие лекарственные формы и дозировки могут удовлетворять потребности данной группы

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата; - кишечная непроходимость; - детский возраст до 18 лет.

Побочные действия

В отдельных случаях: индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Передозировка

Передозировка препарата Эспумизан® маловероятна из-за химической и физиологической инертности препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия препарата Эспумизан® с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания

Не содержит сахар, возможно применение больными сахарным диабетом и нарушениями пищеварения. Возможно применение в периоды беременности и грудного вскармливания.

Условия хранения

При комнатной температуре