Инструкция по применению
Эсслиал форте Капсулы 300 мг 90 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фосфолипиды
Количество в упаковке: 90
Дозировка действующего вещества: 300 мг
Срок годности: 36



Действующее вещество

Фосфолипиды

Состав

1 капсула содержит: Активное вещество: липоид ППЛ-400 – 400,0 мг, в пересчете на полиненасыщенные фосфолипиды из соевого лецитина (фракция PPL) – 300,0 мг, со средним содержанием L-α-фосфатидилхолина 76% – 228,0 мг. Вспомогательные вещества: спирт этиловый 95% – 4,0 мг. Капсулы твердые желатиновые № 0: Состав корпуса капсулы: краситель железа оксид черный – 0,01%, краситель железа оксид красный – 0,01%, краситель железа оксид желтый – 0,1714%, титана диоксид – 3%, желатин – до 100%; Состав крышечки капсулы: краситель железа оксид черный – 0,53%, краситель железа оксид красный – 0,93%, краситель железа оксид желтый – 0,2%, титана диоксид – 0,3333%, желатин – до 100%

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Хронические гепатиты, цирроз печени, жировая дистрофия печени различной этиологии, токсические поражения печени, алкогольный гепатит, нарушения функции печени при других соматических заболеваниях.   Токсикоз беременности, профилактика рецидивов образования желчных камней, псориаз (в качестве средства вспомогательной терапии),   радиационный синдром.

Способ применения и дозы

Внутрь. Капсулы следует принимать целиком, запивая достаточным количеством воды (примерно, 1 стакан). Для подростков старше 12 лет и весом более 43 кг, а также для взрослых препарат Эсслиал форте рекомендуется принимать по 2 капсулы – 3 раза в день во время еды. Как правило, продолжительность применения не ограничена.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость фосфатидилхолина или других вспомогательных компонентов препарата. Непереносимость сои. Детский возраст до 12 лет (отсутствие достаточной доказательной базы).

Побочные действия

Препарат Эсслиал форте обычно хорошо переносится пациентами. В целях оценки частоты побочных эффектов используются следующие определения: очень часто (>1/10), часто (>1/100 - <1/10), не часто (>1/1000 - < 1/100), редко (>1/10000 - <1/1000), очень редко (<1/10000),   неизвестная частота (по имеющимся данным невозможно установить частоту возникновения). Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко – дискомфорт в эпигастральной области, послабление стула, тошнота, гастралгия. Аллергические реакции: очень редко – сыпь, экзантема, крапивница; неизвестная частота – зуд.

Условия хранения

Не подвергать воздействию прямого солнечного света