Инструкция по применению
Эссливер форте Капсулы 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Наброс Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Фосфолипиды
Количество в упаковке: 50



Описание

Твёрдые желатиновые капсулы № 0. корпус красного цвета, крышечка коричневого цвета. содержимое капсулы — порошок от розовато-жёлтого до оранжевого цвета, допускается наличие частиц в виде уплотнённой порошкообразной массы от белого до коричневого цвета, со специфическим запахом.

Действующее вещество

Поливитамины+Фосфолипиды

Состав

Одна капсула содержит: активные вещества: фосфолипиды (эссенциальные фосфолипиды) (содержащие фосфатидилхолин — 29%, фосфатидилэтаноламин и др.) — 300 мг, тиамина мононитрат — 6 мг, рибофлавин — 6 мг, пиридоксина гидрохлорид — 6 мг, альфа-токоферола ацетат (в виде полуфабриката 50 %: альфа-токоферола ацетат, желатин) — 6 мг, никотинамид — 30 мг, цианокобаламин — 6 мкг, вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат натрия — 0,4 мг, пропилпарагидроксибензоат натрия — 0,2 мг, динатрия эдетат — 0,1 мг, бутилгидрокситолуол — 1,0 мг, магния алюмосиликата моногидрат (алюминия-магния силиката гидрат) — 5,0 мг, тальк — до 400 мг. Капсулы твёрдые желатиновые: натрия лаурилсульфат (натрия додецилсульфат), титана диоксид, краситель азорубин (краситель кармазин), краситель солнечный закат жёлтый, краситель бриллиантовый голубой, краситель хинолиновый жёлтый, краситель пунцовый [Понсо-4R], метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия, вода, желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Жировая дистрофия печени различной этиологии, нарушения липидного обмена печени, гепатит, цирроз печени, токсические поражения печени (алкогольные, наркотические, лекарственные), лучевая болезнь, псориаз (в составе комбинированной терапии).

Способ применения и дозы

Внутрь во время еды, проглатывая целиком с достаточным количеством воды. Взрослым — по 2 капсулы 2-3 раза в день. Детям с 12 до 18 лет — по 1 капсуле 2-3 раза в день. Продолжительность курса лечения составляет 3 месяца, при продлении курса лечения необходима консультация врача. При псориазе в течение 2 недель по 2 капсулы 3 раза в день.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет. С осторожностью возможно применение при беременности, в период лактации.

Побочные действия

Аллергические реакции, чувство дискомфорта в эпигастральной области.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Эссливер Форте® не сообщалось.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.