Инструкция по применению
Этексидаб Капсулы 110 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Индия
Производитель: Симпекс Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Дабигатрана этексилат
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 110 мг
Срок годности: 24



Описание

Препарат представляет собой капсулы размером "1", крышечка и корпус непрозрачные, светло-голубого цвета, заполнены пеллетами от бледно-желтого до желтого цвета.

Действующее вещество

Дабигатрана этексилат

Состав

Препарат ЭТЕКСИДАБ® содержит Действующим веществом является: дабигатрана этексилат. Каждая капсула содержит 110 мг дабигатрана этексилата (в виде дабигатрана этексилата мезилата). Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: пеллеты винной кислоты (25#30), акации камедь, винная кислота, гипромеллоза (HPMC-E15), диметикон, тальк, гипролоза (HPC-LF), гипромеллозная капсула (титана диоксид (E171), индигокармин (E132), гипромеллоза, вода очищенная, каррагинан, калия хлорид).

Форма выпуска

Капсулы

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Если Вы беременны, Вы можете принимать препарат ЭТЕКСИДАБ® только в том случае, если Ваш лечащий врач рекомендовал Вам принимать его, зная о Вашей беременности, и оценил пользу и риск применения препарата. Грудное вскармливание Если Вы кормите грудью, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Используйте надежные методы контрацепции (противозачаточные средства), чтобы предотвратить беременность во время лечения препаратом ЭТЕКСИДАБ®.

Особые указания

Влияние препарата ЭТЕКСИДАБ® на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, не изучалось, но учитывая, что прием препарата ЭТЕКСИДАБ® может сопровождаться повышенным риском кровотечений, следует соблюдать осторожность при выполнении таких видов деятельности.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить при температуре не выше 25 °C.