Инструкция по применению
Этоксисклерол Раствор для инъекций 30 мг/мл ампулы 2 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: КРЕЙССЛЕР ФАРМА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Лауромакрогол 400
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 30 мг/мл
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Лауромакрогол 400

Состав

Действующее вещество: PolidocanolКонцентрация действующего вещества (мг): 30

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Объем распределения - 24,5 л, связывание с белками плазмы - 64%, T1/2 - 4 ч. Общий Cl - 11,7 л/ч, почечный - 2,43 л/ч, билиарный - 3,14 л/ч. При повторных введениях не кумулирует.

Показания

Для склерозирования варикозно расширенных вен конечностей, пищевода, желудка, а также геморроидальных узлов, телеангиэктазий периферических и центральных вен.

Способ применения и дозы

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы.

Противопоказания

Шок, эндокардит, миокардит, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, острые инфекционно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся лихорадкой (в т.ч. местные), бронхиальная астма, легочные заболевания в фазе обострения; сахарный диабет в фазе декомпенсации, диабетическая микроангиопатия; I триместр и после 36 недель беременности, за исключением острого кровотечения; повышенная чувствительность к активному веществу. Для склерозирования варикозно расширенных вен нижних конечностей: острый тромбоз поверхностных и глубоких вен, тромбофлебит глубоких вен, окклюзия артерий 3-й и 4-й степени.Не применяют у лежачих больных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан к применению в I триместре и после 36 недель беременности (за исключением острого кровотечения).

Побочные действия

Системные реакции: возможны лихорадка, экссудативный плеврит; редко - кожная сыпь; очень редко - коллапс, головокружение, затруднение дыхания и чувство тяжести в груди, тошнота, нарушения зрения, локальные нарушения чувствительности, металлический привкус, анафилактический шок.Местные реакции: в зависимости от места введения могут развиваться некрозы и изъязвления пищевода, дисфагия, стеноз пищевода, очень редко - перфорация пищевода; гиперпигментация, перифлебит, тромбофлебит, некрозы тканей (особенно при паравазальном введении); при склерозировании геморроидальных узлов - во время и после инъекции возможны преходящие боли, очень редко - боли в области предстательной железы, а также преходящие нарушения эрекции.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает аритмогенный эффект общих анестетиков.

Особые указания

Не допускать в/а введения. Введение склерозирующих средств в вены лицевой части черепа возможно только по строгим показаниям.С особой осторожностью применяют при варикозном расширении вен нижних конечностей при окклюзии артерий 2-й степени, а также у пациентов пожилого возраста при ограниченной способности к движению и тяжелом общем состоянии.При одновременном применении со средствами для наркоза имеется риск развития аритмогенного действия.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении