Инструкция по применению
Эубикор Порошок саше 3 г 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: НПК БИК
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Нормализует микрофлору кишечника и улучшает функциональное состояние ЖКТ. Выраженное сорбционное действие позволяет эффективно бороться с экзогенными или эндогенными интоксикациями, включая алкогольную, пищевую и др. Клетчатка из пшеничных отрубей разлагается до моносахаридов - идеальной среды в кишечнике для размножения сахаролитических микроорганизмов, включая бифидобактерии, лактобактерии. Происходит активизация развития благоприятной микрофлоры и вытеснение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, а также снижается токсическое влияние, вызванное их жизнедеятельностью. Стимулирует перистальтику, ее активное расщепление и образование специфических кислот снижает pH продуктов в толстом кишечнике. Сахаромицеты (Saccharomyces cerevisiae) или, по-другому, винные дрожжи в активированном состоянии являются источником целого ряда витаминов группы B, A, E, C, D3, а также микро-, макроэлементов и практических всех аминокислот. Когда организм насыщен полезными веществами повышается общий иммунитет и увеличивается стойкость к патогенным вирусам и бактериям.

Состав

Экструдированные пшеничные отруби, инактивированная дрожжевая культура Saccharamyces cerevisiae (vini), пищевые волокна и пектин яблока сублимационной сушки.

Форма выпуска

Порошок

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 12 лет - по 1-2 пакетика 3 раза в день. При дефиците пищевых волокон в пище, рекомендуется постоянный прием. При антибиотикотерапии - с первого дня приема антибиотиков принимать по 1-2 пакетика 3 раза в день. При интоксикации (инфекционной, пищевой, алкогольной) принимать по 2-4 пакетика каждые 30-40 минут до улучшения состояния, с последующим продолжением курса по 1-2 пакетика 3 раза в день. При погрешностях в диете - (обильная, острая, жирная пища) - принимать по 2-4 пакетика, каждые 2 часа до улучшения состояния. При запорах - принимать по 1-2 пакетика 3 раза в день. При диарее - в острый период принимать по 2-4 пакетика. В период реконвалесценции: принимать по 1-2 пакетика 3 раза в день. С профилактической целью принимать по 1-2 пакетика 3 раза в день. Запивая водой (150-200 мл) или добавляя в негорячую пищу. В течение дня необходимо соблюдать питьевой режим 1,5-2 л жидкости в день.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, возраст младше 12 лет.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме с другими препаратами необходимо выдерживать интервал между приемами не менее 0,5 часа.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.