Инструкция по применению
Эубикор Порошок саше 3 г 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: НПК БИК
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Порошок Эубикор рекомендуется в составе комплексной диетической терапии и профилактики многих заболеваний. Обладая выраженными свойствами пребиотических соединений, Эубикор предназначен для нормализации микрофлоры кишечника, улучшения функционального состояния желудочно-кишечного тракта, рекомендован в качестве дополнительного источника пищевых волокон.

Состав

инактивированная дрожжевая культура Saccharomyces cerevisiae (vini).

Форма выпуска

Порошок

Показания

Рекомендуется в составе комплексной диетической терапии и профилактике: дисбиотических нарушений различной этиологии, в т.ч. в результате антибиотикотерапии, хронических гастритов и гастродуоденитов, функциональной (неязвенной) диспепсии с дискинетическим синдромом, язвенной болезни, в том числе при эрадикации Helicobacter pylori (на фоне и после приема антибиотиков), дискинезии желчевыводящих путей, в том числе с явлениями холестаза и дисхолии, синдрома раздраженного кишечника с болями и метеоризмом, диареей или запорами, хронических функциональных запоров, в том числе на фоне нарушенной фиксации (опущении) толстой кишки и долихосигмы, хронического холецистита, хронического панкреатита, гепатитов и гепатозов, кишечных инфекций, глистных и паразитарных инвазий, аллергодерматозов и дерматитов (в т.ч. акне), псориаза и атопического дерматита, в том числе с гастроинтестинальными симптомами, ожирения и метаболического синдрома, сахарного диабета 2 типа, атерогенной дислипидемии, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, дисциркуляторной энцефалопатии, ранних токсикозов беременных и гестационных запоров, гинекологических заболеваний кандидозной, бактериальной и вирусной природы, недостаточности питания, дис- и гиповитаминозов, состояний дезадаптации (в т.ч. выраженных физических и эмоциональных нагрузок, «диареи путешественников»).

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 12 лет – по 1-2 пакетика 3 раза в день, запивая водой (150-200мл) или во время еды (добавляя в негорячую пищу). Рекомендуемая продолжительность курса – 3-4 недели. При дефиците пищевых волокон в пище, а также при хронических заболеваниях – рекомендуется постоянный прием. При антибиотикотерапии – с первого дня приема антибиотиков принимать по 1-2 пакетика 3 раза в день. В течение дня необходимо соблюдать питьевой режим 1,5-2 л. жидкости в день. Продолжительность курса – в период приема антибиотиков и в течение 3-4 недель после завершения антибиотикотерапии. При интоксикации (инфекционной, пищевой, алкогольной) принимать по 2-4 пакетика каждые 30-40 минут до улучшения состояния, с последующим продолжением курса по 1-2 пакетика 3 раза в день. Рекомендуется обильное питье. При погрешностях в диете (обильная, острая, жирная пища) – принимать по 2-4 пакетика каждые 2 часа до улучшения состояния. При запорах – принимать по 1-2 пакетика 3 раза в день, запивая водой (150-200 мл) за 30 минут до еды. В течение дня необходимо соблюдать питьевой режим 1,5-2 л. Минимальная продолжительность курса 3-4 недели. При диарее – в острый период принимать по 2-4 пакетика каждые 30-40 минут до улучшения состояния в период реконвалесценции: принимать по 1-2 пакетика 3 раза в день. Минимальная продолжительность курса 3-4 недели. С профилактической целью принимать по 1-2 пакетика 3 раза в день, запивая водой (150-200 мл), в течение 3-4 недель.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ограничений нет.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре не выше 25 °C