Инструкция по применению
Эваменол Назо Капли назальные 1 % + 3 % 12 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество:
Левоментол+Фенилсалицилат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%+ 3%

Описание

Бесцветная маслянистая жидкость с запахом ментола.

Действующее вещество

Левоментол+Фенилсалицилат

Форма выпуска

Капли

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, трахеит). Препарат применяется для симптоматического лечения в комплексной терапии для облегчения носового дыхания.

Способ применения и дозы

Местно (интраназально). Взрослым и детям с 6-ти лет по 2 капли в каждый носовой ход или в виде смазывания слизистой оболочки носовых ходов ватной палочкой, смоченной препаратом, 2-3 раза в день. При сохранении симптомов более 3-х дней необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 6 лет, бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с недостаточностью клинических данных).

Побочные действия

Аллергические реакции, контактный дерматит, бронхоспазм, появление жжения, чихания или усиление заложенности носа. При появлении нежелательных явлений или других необычных реакций, не описанных в инструкции, необходимо обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось. Возможная передозировка может привести к дискомфорту со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноте. Лечение: симптоматическое под контролем врача.

Взаимодействие с другими препаратами

В настоящее время данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. При случайном попадании препарата в глаза рекомендуется обильно промыть водой. При ухудшении состояния или сохранении симптомов более 5-10 дней, необходимо проконсультироваться с врачом. Не применять более 3-х дней, при необходимости применения более 3-х дней необходима консультация с врачом. Частое и длительное применение препарата может привести к усилению заложенности носа. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Срок хранения после открытия

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.