Инструкция по применению
Фактив таблетки покрытые оболочкой 320мгN7

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гемифлоксацин
Количество в упаковке: 7
Дозировка действующего вещества: 320 мг

Описание

Таблетки Фактив - это бактерицидный антибиотик. К Фактиву чувствительны микроорганизмы из разных групп: грамположительные, грамотрицательные, аэробные и анаэробные, а также атипичные бактерии. К тому же, если бактерии выработали устойчивость к антибиотикам других групп, то они все-таки могут быть успешно излечены Фактивом.

Действующее вещество

Гемифлоксацин

Состав

Мезилат гемифлоксацина (в форме сесквигидрата), МКЦ, повидон, полипласдон ИКС ЭЛ-10 (кросповидон), стеарат магния, Оболочка: Opadry II.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Быстро абсорбируется из ЖКТ. После однократного приема препарата в дозе 320 мг Cmax в плазме крови достигается в течение 0.5-2 ч. При курсовом приеме 320 мг гемифлоксацина 1 раз/сут Cmax достигается на третий день. При повторном приеме 55-73% препарата связывается с белками плазмы, доля связанной фракции не зависит от возраста. Гемифлоксацин хорошо проникает в ткани легкого. Концентрация гемифлоксацина в бронхоальвеолярном лаваже выше таковой в плазме. В небольшом количестве гемифлоксацин метаболизируется в печени. Спустя 4 ч после приема неизмененный гемифлоксацин преобладает среди метаболитов препарата (65%) в плазме крови.У здоровых лиц 61.0±9.5% дозы гемифлоксацина выводится через кишечник, а 36.0±9.3% с мочой в виде неизмененного препарата и продуктов метаболизма. При гемодиализе из плазмы выводится 20-30% дозы гемифлоксацина.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами: обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония (в т.ч. вызванная полирезистентными штаммами), острый синусит.

Способ применения и дозы

Назначают по 320 мг 1 раз/сут. При обострении хронического бронхита курс лечения составляет 5 дней, при внебольничной пневмонии - 7 дней, при остром синусите - 5 дней. Таблетки следует принимать внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды, независимо от приема пищи.

Противопоказания

Удлинение интервала QT на ЭКГ (в т.ч. врожденное), поражения сухожилий, перенесенные ранее вследствие применения фторхинолонов, индивидуальная непереносимость гемифлоксацина и других фторхинолонов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано

Побочные действия

Кожный зуд, крапивница, тошнота, диарея, рвота, боли в животе, метеоризм, анорексия, лейкопения.

Передозировка

Лечение: промывание желудка, искусственная рвота, обильное питье, при необходимости проводят симптоматическую терапию. Специфический антидот неизвестен. При гемодиализе из плазмы крови выводится 20-30% дозы гемифлоксацина.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном назначении Фактива с антацидами, содержащими алюминий и магний или с сульфатом железа биодоступность гемифлоксацина снижается. Антациды следует принимать не менее чем за 3 ч до или не ранее чем через 2 ч после приема гемифлоксацина.Сукральфат при одновременном применении снижает биодоступность гемифлоксацина. Сукральфат следует принимать не ранее чем через 2 ч после приема гемифлоксацина.Эстроген-гестагенные пероральные контрацептивы незначительно уменьшают биодоступность гемифлоксацина.Курсовой прием гемифлоксацина не влияет на фармакокинетику пероральных противозачаточных препаратов, содержащих этинилэстрадиол/левоноргестрел.

Особые указания

В период лечения гемифлоксацином необходимо обеспечить поступление достаточного количества жидкости при соблюдении нормального диуреза.