Инструкция по применению
Фамилар таблетки 500 мг 3 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Розлекс Фарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фамцикловир
Количество в упаковке: 3
Дозировка действующего вещества: 500 мг

Описание

Таблетки Фамилар являются противовирусным средством. Применяются для лечения инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster (опоясывающий лишай, включая опоясывающий лишай с глазными осложнениями), инфекции, вызванных вирусом Herpes simplex (первичная инфекция, обострение хронической инфекции, супрессия рецидивирующей инфекции).

Действующее вещество

Фамцикловир

Состав

Активное вещество: фамцикловир 500 мг.Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 305 мг, кроскармеллоза натрия - 50 мг, лактозы моногидрат - 200 мг, кросповидон XL-10 - 45 мг, стеарат магния - 12 мг, диоксид кремния коллоидный - 5 мг, тальк - 3 мг. Состав оболочки: опадрай белый - 14 мг (поливиниловый спирт (гидролизированный) - 38.6%, диоксид титана - 30%, тальк - 17.5%, макрогол 4000 - 10.9%, лецитин - 3%), гипромеллоза - 1.2 мг, макрогол 4000 - 0.04 мг, полисорбат 80 - 0.76 мг, диоксид титана - 4 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Инфекции, вызванные вирусом Varicella zoster (опоясывающий лишай, включая опоясывающий лишай с глазными осложнениями), инфекции, вызванные вирусом Herpes simplex (первичная инфекция, обострение хронической инфекции, супрессия рецидивирующей инфекции).

Способ применения и дозы

Лечение следует начинать сразу после установления диагноза. При приеме внутрь разовая доза - 250-500 мг. Частота и длительность применения зависят от показаний, состояния иммунитета, функции почек, эффективности лечения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

Возможны: слабые и умеренные головные боли, тошнота. Редко: рвота, головокружение, кожная сыпь, преимущественно у пациентов пожилого возраста - спутанность сознания, галлюцинации. У пациентов со сниженным иммунитетом: возможны боли в животе, лихорадка, редко – гранулоцитопения и тромбоцитопения.

Взаимодействие с другими препаратами

Пробенецид и другие препараты, оказывающие влияние на функцию почек, могут изменять уровень пенцикловира в плазме.

Особые указания

Противопоказания: повышенная чувствительность к фамцикловиру и пенцикловиру. Применение при беременности и кормлении грудью Поскольку безопасность фамцикловира при беременности и в период лактации не изучена, применение не рекомендуется, за исключением случаев, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка. Неизвестно, выделяется ли пенцикловир с грудным молоком у человека. Фамцикловир не оказывает выраженного эффекта на спермограмму, морфологию или подвижность сперматозоидов человека. В экспериментальных исследованиях не выявлено эмбриотоксического и тератогенного действия фамцикловира и пенцикловира. Исследования на крысах, получавших фамцикловир внутрь, показали, что пенцикловир выделяется с грудным молоком. Снижение фертильности было отмечено в экспериментальной модели у крыс мужского пола, получавших фамцикловир в дозе 500 мг/кг массы тела, у крыс женского пола выраженного снижения фертильности не отмечено. Применение при нарушениях функции почек С осторожностью применять у пациентов с нарушением функции почек.