Инструкция по применению
Фарингопронт Таблетки для рассасывания 10 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Россия
Производитель: Авва Рус
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амбазон
Количество в упаковке: 1



Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки от светло-коричневого до коричневого цвета с фаской, с вкраплениями от почти белого до тёмно-коричневого цвета.

Действующее вещество

Амбазон

Состав

Состав на одну таблетку: Таблетки для рассасывания Таблетки для рассасывания со вкусом корицы / Таблетки для рассасывания со вкусом лимона Действующее вещество: Амбазона моногидрат 10,0 мг 10,0 мг Вспомогательные вещества: Лактитол 400,0 мг 400,0 мг Лактозы моногидрат 150,0 мг 150,0 мг Какао-порошок 98,0 мг 98,0 мг Повидон К-29/32 50,0 мг 50,0 мг Гипромеллоза 42,0 мг 42,0 мг Стеариновая кислота 10,0 мг 10,0 мг Ароматизатор* 2,0 мг Сорбитол До получения таблетки массой 1400,0 мг До получения таблетки массой 1400,0 мг * - в зависимости от вкуса лекарственного препарата используется ароматизатор лимон или ароматизатор корица.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Фармакокинетика

Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается на 3–4 день приёма препарата при дозе 0,03–0,05 г/сут.

Показания

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки: тонзиллит, гингивит, стоматит, фарингит.

Способ применения и дозы

Местно. Таблетки следует рассасывать до полного растворения (через 15–30 минут после еды). После применения таблеток следует воздержаться в течение 3 часов от питья и приёма пищи. Взрослым: по 4–5 таблеток (0,04–0,05 г) в сутки. Детям: от 3 до 7 лет по 3 таблетки (0,03 г) в сутки. Курс лечения 3–4 дня.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к амбазону и другим компонентам препарата, непереносимость лактозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит лактазы, детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременным и кормящим женщинам следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата. При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребёнка.

Побочные действия

Аллергические реакции на компоненты препарата, кожная сыпь. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки амбазона неизвестны. Антидота нет. Возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта. При применении чрезмерной дозы рекомендуется промыть желудок.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Особые указания

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. Препарат противопоказано применять пациентам с наследственной непереносимостью лактозы. Увеличение дозы не оказывает большего клинического эффекта. При сохранении симптомов или при увеличении температуры тела, или головной боли следует обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.