Инструкция по применению
Фарингосепт Таблетки для рассасывания 10 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Румыния
Производитель: С.К. ТЕРАПИЯ С.А.
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амбазон
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 24



Описание

Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

Действующее вещество

Амбазон

Состав

Каждая таблетка для рассасывания содержит: Активное вещество: амбазона моногидрата 10,0 мг. Вспомогательные вещества: сахароза 729,0 мг, лактозы моногидрат 150,0 мг, какао-бобов порошок 50,0 мг, повидон К-30 50,0 мг, ванилин 1,0 мг, стеариновая кислота 10,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Фармакокинетика

Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается на 3-4 день приема препарата при дозе 0,03-0,05 г/сут.

Показания

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки: тонзиллит, гингивит, стоматит, фарингит.

Способ применения и дозы

Местно. Таблетки следует рассасывать до полного растворения (через 15-30 минут после еды). После применения таблеток следует воздержаться в течение 3 часов от питья и приема пищи. Взрослым: по 4-5 таблеток (0,04-0,05 г) в сутки. Детям: от 3 до 7 лет 3 таблетки (0,03 г) в сутки. Курс лечения 3-4 дня.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к амбазону и другим компонентам препарата; непереносимость лактозы, фруктозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, глюкозогалактозная мальабсорбция, дефицит лактазы; детский возраст до 3 лет

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременным и кормящим женщинам следует посоветоваться с врачом перед применением препарата. При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции на компоненты препарата, кожная сыпь. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки амбазона неизвестны. Антидота нет. Возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта. При применении чрезмерной дозы рекомендуется промыть желудок.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Особые указания

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. Препарат не рекомендуется применять пациентам с наследственной непереносимостью сахарозы и лактозы. Увеличение дозы не оказывает большего клинического эффекта. При сохранении симптомов или при появлении повышения температуры тела или головной боли следует обратиться к врачу. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте