Инструкция по применению
Феброфид Гель 2,5 % 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Польша
Производитель: Акрихин
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кетопрофен
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2,5%
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Кетопрофен

Состав

100 г кетопрофена лизиновая соль 2.5 г, что соответствует содержанию кетопрофена 1.6 г. Вспомогательные вещества: макрогол 200 - 5 г, метилпарагидроксибензоат - 0.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Кетопрофен хорошо проникает через кожу, что обеспечивает местное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Биодоступность геля - около 5%. Связывание с белками плазмы крови - 99%. Не кумулирует в организме. Метаболизируется в печени. Около 80% принятой дозы выделяется с мочой в виде метаболитов, менее 10% выделяется в неизмененном виде.

Показания

В качестве препарата для наружного применения при симптоматическом лечении: — болей в позвоночнике — невралгии — миалгии — воспалительно-дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата (в т.ч. артрит, бурсит, синовит, тендинит, люмбаго) — неосложненных травм (в т.ч. спортивных, вывихов, растяжений или разрывов связок и сухожилий, ушибов, посттравматических болей) — в составе комбинированной терапии при воспалительных заболеваниях вен (флебит, перифлебит), лимфатических сосудов, лимфоузлов (лимфангит, поверхностный лимфаденит).

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для наружного применения. Небольшое количество (полоску длиной 3-5 см) геля 2-3 раза/сут нанести на соответствующий участок кожи и слегка втереть. Нет необходимости в применении сухой повязки, т.к. гель хорошо всасывается через кожу, не имеет запаха, не содержит красящих веществ, не оставляет жирных пятен, не пачкает одежды.

Противопоказания

— мокнущие дерматозы, экзема — инфицированные ссадины, раны, ожоги — III триместр беременности — период лактации (грудного вскармливания) — повышенная чувствительность к кетопрофену и/или другим компонентам препарата — повышенная чувствительность к другим НПВС (кетопрофен может вызвать бронхоспазм у лиц, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВС).

Применение при беременности и кормлении грудью

В I и II триместрах беременности препарат можно применять только в случае необходимости. В III триместре беременности применение препарата противопоказано. Не рекомендуется применять препарат в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции, гиперемия кожи, фотосенсибилизация, кожная экзантема, пурпура.

Передозировка

В связи с низкой системной абсорбцией Передозировка препарата Феброфид маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

При частом и длительном применении могут появиться симптомы взаимодействия с другими препаратами (такие же, как при системном применении). При совместном приеме с другими НПВС, ГКС, этанолом, кортикотропином возможно образование язв и развитие желудочно-кишечных кровотечений. Одновременное применение с пероральными антикоагулянтами, гепарином, тромболитиками, антиагрегантами, цефоперазоном, цефамандолом повышает риск развития кровотечений. Кетопрофен снижает действие гипотензивных препаратов и диуретиков (ингибирование синтеза простагландинов). Повышает гипогликемическое действие инсулина и пероральных гипогликемических препаратов (необходима коррекция дозы). Совместное назначение с вальпроатом натрия вызывает нарушение агрегации тромбоцитов. Повышает концентрацию верапамила и нифедипина в плазме крови.

Особые указания

Следует не допускать попадания геля на слизистые оболочки и в глаза. Препарат нельзя наносить на поврежденные участки кожи. Необходимо соблюдать осторожность при длительном применении у пациентов с печеночной или почечной недостаточностью тяжелой степени. В случае появления сыпи необходимо прекратить применение препарата и провести соответствующую терапию.

Условия хранения

В сухом месте