Инструкция по применению
ФЕМИДЕЛЬ ПРО 0,01 N6 ТАБЛ ВАГ

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки вагинальные
Страна: Россия
Производитель: Алиум
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Деквалиния хлорид
Количество в упаковке: 6
Срок годности: более 6 мес



Действующее вещество

Деквалиния хлорид

Состав

1 таблетка содержит:действующее вещество: деквалиния хлорид - 10 мг; вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая тип 101, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки вагинальные

Фармакокинетика

При интравагинальном введении крайне незначительное количество деквалиния хлорида всасывается через слизистую оболочку влагалища в системный кровоток, метаболизируется до производного 2,2-дикарбоновой кислоты и выводится в неконъюгированной форме через кишечник.

Показания

бактериальный вагинозкандидозный вагиниттрихомонадный вагинитсанация влагалища перед гинекологическими операциями и родами

Способ применения и дозы

Только для интравагинального применения.Рекомендуемый режим дозирования - 1 вагинальная таблетка в сутки.Вагинальную таблетку вводят глубоко во влагалище вечером перед сном,лежа на спине, слегка согнув ноги.Курс лечения 6 дней.Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются,или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применениями в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.Во время менструации лечение следует прекратить и продолжить прежний курспосле ее окончания. Необходимо провести полный курс (6 дней) во избежание рецидива.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к деквалинию хлориду и другим компонентампрепарата.Язвенные поражения эпителия влагалища и шейки матки. Противопоказано применение деквалиния хлорида до начала половой жизни.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат разрешен к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Крайне редко могут наблюдаться местные реакции раздражения (эрозии),зуд, жжение или покраснение слизистой оболочки влагалища. Однако эти нежелательные реакции также могут быть связаны с симптомами вагинальной инфекции.Крайне редко: лихорадка, аллергические реакции.Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном приеме препарата внутрьвозможно усиление побочных эффектов. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.Деквалиния хлорид несовместим с мылом и другими анионными поверхностно-активными веществами.

Особые указания

по медицинскому применению лекарственного препаратаФЕМИДЕЛЬ®ПРОтаблетки вагинальные

Условия хранения

от 2# до 25#