Инструкция по применению
Фемиплан Тест на овуляцию Тест-полоска 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Тест
Страна: Великобритания
Производитель: Спектрум
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 5

Описание

Свыше 99%, если тест используется со дня ожидаемого начала менструации. Чувствительность 25мМЕ/мл Что такое овуляция? Овуляция (от лат. " ovulum" - яйцо) - это период, когда из одного из фолликулов яичников выходит созревшая, готовая к оплодотворению яйцеклетка. Период созревания яйцеклетки до ее выхода из фолликула может длиться от 8 дней до месяца, но в среднем он длится 2 недели. Основным фактором, влияющим на продолжительность этого процесса, является время, которое требуется организму для достижения предельного уровня эстрогена, что, в свою очередь, стимулируется увеличением лютеинизирующего гормона (ЛГ). Принцип действия Тесты для определения овуляции выявляют максимальный рост ЛГ в моче, который происходит обычно за 24-36 часов перед овуляцией, и, таким образом, указывают те 2 дня, когда вероятность зачатия наиболее высока. С какого дня начинать тестирование? Это зависит от продолжительности менструального цикла. Первым днем цикла является день, когда началась менструация. Длина цикла - это количество дней, прошедших с первого дня последней менструации до первого дня следующей. Если у вас постоянный цикл, то начинать делать тесты нужно приблизительно за 17 дней до начала ожидаемого начала следующей менструации. К примеру, если обычная длина вашего цикла - 28 дней, то тестирование нужно начинать с 11-го дня, а если 35, то с 18-го. Если менструальный цикл непостоянный, то для расчетов нужно выбрать самый короткий цикл за последние 6 месяцев.

Состав

5 тест-полосок в упаковке.

Форма выпуска

Тест

Показания

Тест для определения овуляции.

Взаимодействие с другими препаратами

Препараты для повышения фертильности и лечения бесплодия, содержащие НС или ДР (т.е. хоригон, перегнил и т.п., обычно вводятся в виде инъекций), могут стать причиной ошибочных результатов. Беременность, либо гормональные изменения в возрасте переходного периода могут дать ошибочный результат из-за наличия гормонов, не имеющих отношения к процессу овуляции - Большинство лекарств (антибиотики, болеутоляющие и т.п.) не оказывают влияния на результаты теста. Если вы недавно перестали использовать гормональную контрацепцию, или принимаете такие средства для лечения бесплодия как кломифена цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, следствием чего может стать преждевременное тестирование.

Особые указания

Если повышение содержания ЛГ не проявилось в течение двух менструальных циклов, то следует обратиться к врачу.

Условия хранения

Беречь от детей; в сухом месте