Инструкция по применению
Фенибут Таблетки 250 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Усолье-Сибирский Химфармзавод
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Аминофенилмасляная кислота
Количество в упаковке: 50 таблеток
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 3 года

Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с фаской и риской.

Действующее вещество

Аминофенилмасляная кислота

Состав

На одну таблетку:Действующее вещество:Аминофенилмасляной кислоты гидрохлорид - 250,0 мг,Вспомогательные вещества:лактоза (сахар молочный) - 181,4 мгкрахмал картофельный - 63,6 мгкальция стеарат - 5,0 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Аминофенилмасляная кислота хорошо всасывается после приема внутрь и проникает во все ткани организма легко преодолевает гематоэнцефалический барьер. В ткани головного мозга проникает около 01% введенной дозы препарата причем у лиц молодого и пожилого возраста в значительно большей степени. Метаболизируется в печени - 80-95% до фармакологически неактивных метаболитов. Около 5% выводится почками в неизмененном виде частично - с желчью. При повторном приеме кумуляция не наблюдается.

Показания

Астенические и тревожно-невротические состояния, заикание тики и энурез у детей, бессонница и ночная тревога у пожилых, болезнь Меньера, головокружения связанные с дисфункцией вестибулярного анализатора различного генеза, профилактика укачивания при кинетозах, в составе комплексной терапии при алкогольном абстинентном синдроме для купирования психопатологических и соматовегетативных расстройств.

Способ применения и дозы

Внутрь после еды запивая водой. Не разжевывать. Таблетки можно делить. Астенические и тревожно-невротические состояния Взрослые: по 250-500 мг 3 раза в день. Максимальная однократная доза - 750 мг (3 таблетки) для пациентов старше 60 лет - 500 мг. Курс лечения - 2-3 недели. При необходимости суточную дозу повышают до 2500 мг. Курс лечения - 4-6 недель. Дети: с 3 до 8 лет - по 125 мг 2-3 раза в день, от 8 до 14 лет - по 250 мг 2-3 раза в день, дети старше 14 лет - дозы для взрослых. Заикание тики и энурез у детей: от 3 до 8 лет -125 мг до 3 раз в день, от 8 до 14 лет - по 250 мг 3 раза в день, дети старше 14 лет - дозы для взрослых. Бессонница и ночная тревога у пожилых: по 250-500 мг 3 раза в день. Болезнь Меньера головокружения связанные с дисфункцией вестибулярного анализатора различного генеза: В период обострения у взрослых по 750 мг 3-4 раза в сутки на протяжении 5-7 дней затем по 250-500 мг 3 раза в сутки в течение 5-7 дней и затем - по 250 мг 1 раз в день в течение 5 дней. Для лечения головокружения при дисфункциях вестибулярного анализатора сосудистого и травматического генеза - по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении 12 дней. Для профилактики укачиваний при кинетозах по 250-500 мг однократно за 1 час до предполагаемого путешествия или при появлений- первых симптомов укачивания. Противоукачивающее действие усиливается при увеличении дозы препарата. Препарат малоэффективен при выраженных явлениях укачивания ("неукротимая" рвота и другие). В составе комплексной терапии при алкогольном абстинентном синдроме в целях купирования психосоматических и соматовегетативных расстройств В первые дни лечения назначают по 250-500 мг 3 раза в течение дня и 750 мг на ночь с постепенным снижением суточной дозы до обычной для взрослых.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или вспомогательным веществам препарата беременность грудное вскармливание дети до 3-х лет.Препарат содержит лактозу.Не следует применять пациентам с редкой врождённой непереносимостью галактозы дефицитом лактазы или с глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение во время беременности и в период кормления грудью не рекомендуется т.к. нет достаточного количества клинических наблюдений. В экспериментальных исследованиях на животных не установлено мутагенного тератогенного и эмбриотоксическою действия препарата.

Побочные действия

Фенибут как и другие лекарства может вызывать побочные действия которые проявляются не у всех пациентов. Обычно Фенибут обычно хорошо переносится. Возможны: Нарушения со стороны нервной системы: сонливость и усиление симптомов (в начале лечения) головокружение головная боль, Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота (в начале лечения), Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: аллергические реакции (кожная - сыпь зуд), Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: при длительном применении высоких доз - гепатотоксичность.

Передозировка

Лекарственное средство малотоксично. Данных о случаях передозировки не поступало.Симптомы: сонливость тошнота рвота головокружение. При длительном применении высоких доз может развиваться эозинофилия снижение артериального давления нарушения почечной деятельности жировая дистрофия печени (прием более 7 г).Лечение: промывание желудка симптоматическое лечение поддержание жизненно важных функций. Специфического антидота нет.

Взаимодействие с другими препаратами

С целью взаимного потенцирования фармакологического эффекта препараты аминофенилмасляной кислоты допускается комбинировать с другими психотропными препаратами, уменьшая дозы фенибута и сочетаемых лекарственных средств. Удлиняет и усиливает действие снотворных препаратов, наркотических анальгетиков, нейролептиков, противопаркинсонических и противоэпилептических средств.

Особые указания

При длительном применении (более 2-3 недель) необходимо контролировать показатели периферической крови и функции печени каждые 2-3 недели. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций поскольку у некоторых пациентов могут наблюдаться нарушения со стороны центральной нервной системы такие как сонливость и головокружение.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.