Инструкция по применению
Фенюльс капсулы 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Индия
Производитель: Ранбакси
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Железа сульфат+Витамины
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 100 мг+60 мг

Описание

Капсулы с крышечкой зеленого цвета и прозрачным корпусом, размером №1, содержащие белые, красные и оранжевые пеллеты.

Действующее вещество

Железа сульфат+Витамины

Состав

В1 капсуле содержится:Активные вещества:Безводный железа сульфат 150 мг,Тиамина мононитрат 2 мг,Рибофлавин 2 мг,Аскорбиновая кислота 50 мг,Никотинамид 15 мг, Пантотеновая кислота (в виде кальция пантотената) 2.5 мг,Пиридоксин гидрохлорид 1 мгВспомогательные вещества:гранулы Non Pareil, этилцеллюлоза, шеллак, кармоизин супра, изопропиловый спирт, капсула размером «1» зеленая /прозрачная.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Лечение и профилактика скрытого дефицита железа на фоне обильных и/или длительных менструаций, беременности, лактации, гиповитаминозы группы В.

Способ применения и дозы

При скрытом дефиците железа по 1 капсуле в день. Курс лечения 1 месяц.Для профилактики скрытого дефицита железа (при обильных и длительных менструациях): по 1 капсуле за 1 -2 дня до начала менструации, в течение цикла и 1 -2 дня после окончания.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гемохроматоз, гемосидероз, детский возраст.

Побочные действия

Аллергические реакции, рвота, запоры или диарея, боль в области эпигастрия, головокружение.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.Не следует назначать одновременно с антацидами, содержащими соли алюминия, магния, кальция, так как уменьшается всасывание железа.Железо уменьшает абсорбцию препаратов тетрациклинового ряда. Пиридоксин уменьшает терапевтический эффект леводопы.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что не имеет клинического значения и объясняется наличием в составе рибофлавина.Лечение железодефицитной анемии необходимо проводить под контролем уровня гемоглобина и концентрации железа в сыворотке крови.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.