Инструкция по применению
Фенкарол Таблетки 10 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Латвия
Производитель: OlainFarm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Хифенадин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 60.0



Действующее вещество

Хифенадин

Состав

Хифенадина гидрохлорид 10 мг.; Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 14.5 мг, сахароза - 25 мг, кальция стеарат - 0.5 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание и распределение;Хифенадин быстро абсорбируется из ЖКТ, абсорбция составляет 45%, и уже через 30 мин обнаруживается в тканях организма. Cmax в плазме крови достигается через 1 ч. Обладает низкой липофильностью, плохо проникает через ГЭБ. Наиболее высокая концентрация активного вещества обнаружена в печени, несколько меньшая - в легких и почках, самая низкая - в головном мозге (менее 0.05%, что объясняет отсутствие выраженного седативного и снотворного эффекта).; Метаболизм и выведение;Хифенадин метаболизируется в печени.; Метаболиты выводятся почками и кишечником. Через кишечник выводится неабсорбированная часть препарата.

Показания

— поллиноз; — острая и хроническая крапивница; — ангионевротический отек; — аллергический ринит; — дерматозы (в т.ч. экзема, псориаз, атопический дерматит); — нейродермит; — кожный зуд.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь после еды.; Схема дозирования препарата совпадает при всех показаниях к применению. На дозирование хифенадина может оказывать влияние выраженность аллергической реакции, индивидуальная чувствительность пациента, а также выраженность возможных побочных эффектов.; Взрослым назначают по 50 мг 1-4 раза/сут или по 25 мг 2-4 раза/сут. Максимальная суточная доза - 200 мг. Курс лечения в среднем составляет 10-20 дней. При необходимости курс лечения повторяют.; Детям в возрасте от 3 до 7 лет - по 10 мг 2 раза/сут; в возрасте от 7 до 12 лет - по 10-15 мг 2-3 раза/сут; старше 12 лет - по 25 мг 2-3 раза /сут. Курс лечения - 10-15 дней.

Противопоказания

— беременность; — период лактации (грудного вскармливания); — детский возраст до 3 лет (для таблеток 10 мг и 25 мг); — детский и подростковый возраст до 18 лет (для таблеток 50 мг); — дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, т.к. препарат содержит сахарозу; — повышенная чувствительность к компонентам препарата.; С осторожностью следует назначать препарат при заболеваниях ЖКТ, печени и почек.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности противопоказано.; При необходимости лечения препаратом грудное вскармливание необходимо прекратить.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: сухость слизистой оболочки полости рта, тошнота, рвота.; Со стороны ЦНС: сонливость, головная боль.; Прочие: аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: сухость слизистых оболочек, головная боль, рвота, боли в животе и другие симптомы диспепсии.; Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, проведение симптоматической терапии.; При передозировке пациент должен обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Хифенадин не усиливает угнетающее действие этанола и снотворных средств на ЦНС.; Обладая слабыми м-холиноблокирующими свойствами, препарат может снижать моторику ЖКТ, что способствует увеличению всасывания медленно абсорбирующихся препаратов (например, антикоагулянтов непрямого действия - кумаринов).

Особые указания

Отсутствие выраженного м-холиноблокирующего эффекта позволяет назначать препарат пациентам, которым противопоказаны антигистаминные препараты, обладающие м-холиноблокирующей активностью.; Использование в педиатрии;Детям рекомендуется назначать Фенкарол в форме таблеток 10 мг или 25 мг.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;Фенкарол разрешен к применению лицам, работа которых требует повышенной концентрации внимания и быстрой психомоторной реакции (управление автотранспортом и работа с механизмами), однако рекомендуется предварительно определить (путем краткосрочного назначения), не оказывает ли препарат седативного эффекта.

Условия хранения

Беречь от детей