Инструкция по применению
Фенкарол Таблетки 50 мг 15 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: OlainFarm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Хифенадин
Количество в упаковке: 15
Дозировка действующего вещества: 50 мг



Описание

Фенкарол - блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций.

Действующее вещество

Хифенадин

Состав

Основа: хифенадина гидрохлорид 50 мгВспомогательные вещества: крахмал картофельный - 74 мг, сахароза - 55 мг, крахмал кукурузный модифицированный - 20 мг, кальция стеарат - 1 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание и распределениеХифенадин быстро абсорбируется из ЖКТ, абсорбция составляет 45%, и уже через 30 мин обнаруживается в тканях организма. Cmax в плазме крови достигается через 1 ч. Обладает низкой липофильностью, плохо проникает через ГЭБ. Наиболее высокая концентрация активного вещества обнаружена в печени, несколько меньшая - в легких и почках, самая низкая - в головном мозге (менее 0.05%, что объясняет отсутствие выраженного седативного и снотворного эффекта).Метаболизм и выведениеХифенадин метаболизируется в печени.Метаболиты выводятся почками и кишечником. Через кишечник выводится неабсорбированная часть препарата.

Показания

— поллиноз.— острая и хроническая крапивница.— ангионевротический отек.— аллергический ринит.— дерматозы (в т.ч. экзема, псориаз, атопический дерматит).— нейродермит.— кожный зуд.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь после еды.Схема дозирования препарата совпадает при всех показаниях к применению. На дозирование хифенадина может оказывать влияние выраженность аллергической реакции, индивидуальная чувствительность пациента, а также выраженность возможных побочных эффектов.Взрослым назначают по 50 мг 1-4 раза/сут или по 25 мг 2-4 раза/сут. Максимальная суточная доза - 200 мг. Курс лечения в среднем составляет 10-20 дней. При необходимости курс лечения повторяют.Детям в возрасте от 3 до 7 лет - по 10 мг 2 раза/сут. в возрасте от 7 до 12 лет - по 10-15 мг 2-3 раза/сут. старше 12 лет - по 25 мг 2-3 раза/сут. Курс лечения - 10-15 дней.

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности противопоказано.При необходимости лечения препаратом грудное вскармливание необходимо прекратить.

Взаимодействие с другими препаратами

Хифенадин не усиливает угнетающее действие этанола и снотворных средств на ЦНС. Обладая слабыми м-холиноблокирующими свойствами, препарат может снижать моторику ЖКТ, что способствует увеличению всасывания медленно абсорбирующихся препаратов (например, антикоагулянтов непрямого действия - кумаринов).

Условия хранения

В сухом прохладном месте. Беречь от детей. Не подвергать воздействию прямого солнечного света. При комнатной температуре