Инструкция по применению
Ферлип Таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: Wikenfarma
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 3 года от даты производства



Описание

Из листка-вкладыша: Витаминно-минеральный комплекс на основе железа и витаминов. Ферлип представляет собой микронизированную микроинкапсулированную формупирофосфата железа (Fe3+).Микронизация – процесс размельчения частиц, ведущий к улучшению всасывания.Микроинкапсуляция – покрытие частиц специальной оболочкой, уменьшающейнеблагоприятное воздействие железа на желудочно-кишечный тракт, нежелательноевзаимодействие с другими компонентами, включая пищу, и улучшающей его доступностьдля организма. Эти современные технологии дают Ферлипу следующие свойства, отличающие его отмногих других форм железа:– снижение/отсутствие металлического вкуса;– повышение всасывания/ доступности железа для организма;– уменьшение риска раздражающего действия и нежелательных явлений со стороныжелудочно-кишечного тракта.

Состав

Витамин С (L-аскорбиновая кислота), микронизированное микроинкапсулированное железо (пирофосфат железа на кукурузном крахмале и лецитине подсолнечника), витамин В5 (пантотенат), витамин В2 (рибофлавин), витамин В6 (пиридоксина хлоргидрат), витамин В1 (тиамина хлоргидрат), витамин В9 (фолиевая кислота /кальция L-метилфолат), витамин В12 (цианокобаламин); наполнители: микрокристаллическая целлюлоза, силицированная микрокристаллическая целлюлоза, кальция фосфат, натрия кроскармеллоза, лактоферрин; ингибиторы слеживания: растительный стеарат магния, кремния диоксид. При приеме Ферлип® в рекомендуемой дозе в организм будет поступать: Наименование активных компонентов в 1 таблетке % от РСП* Витамин С (L-аскорбиновая кислота) 70,00 мг 117 Железо (пирофосфат железа) 30,00 мг 214 Витамин В5 (пантотенат) 10,00 мг 167 Витамин В2 (рибофлавин) 2,50 мг 156 Витамин В6 (пиридоксина хлоргидрат) 2,50 мг 125 Витамин В1 (тиамина хлоргидрат) 2,00 мг 143 Витамин В9 (фолиевая кислота /кальция L-метилфолат) 0,40 мг 200 Витамин В12 (цианокобаламин) 4,00 мкг 40 Фолиевая кислота — участвует в делении клеток и способствует нормальному кроветворению; необходима женщинам во время беременности для формирования нервной трубки плода. Витамин С — увеличивает усвояемость железа, предотвращает его окисление, ускоряет гемопоэз, обладает антиоксидантным действием. Витамины группы В — способствуют образованию красных кровяных клеток (эритроцитов), участвуют в метаболических процессах в организме. Ферлип® включается в рацион по назначению врача, например при таких железодефицитных состояниях: • дефицит железа, железодефицитная анемия; • анемия при инфекционных заболеваниях; • кровотечения различного происхождения, в том числе во время менструального цикла; • повышенная потребность в железе во время беременности, грудного вскармливания, донорства крови, интенсивного роста, вегетарианства, пожилой возраст; • выпадение волос, связанное с дефицитом железа (телоген миазмы); • а также иных состояниях, сопровождающихся дефицитом железа.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Дополнительный источник железа и витаминов С, В1, В2, В5, В6, В12.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время основного приёма пищи. При выраженном дефиците железа и витаминов группы В рекомендуется увеличить прием до 2-х таблеток.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Ферлип не является заменой продуктам питания. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу.

Взаимодействие с другими препаратами

Ферлип обладает хорошей переносимостью. Отсутствие металлического привкуса во рту, болей и спазмов в животе, тёмного стула позволяет использовать Ферлип® у лиц с дефицитом железа без ограничений по возрасту и физиологическому состоянию.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре от +8 °С до +25 °С.