Инструкция по применению
Фероглобин-в12 сироп 200мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Великобритания
Производитель: Vitabiotics
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Прочие препараты
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Поливитамины+Прочие препараты

Состав

Сироп 5 мл аскорбиновая кислота 10 мг железо (в форме цитрата аммониевого железа) 7 мг йод (в форме калия йодида) 40 мкг кальция глицерофосфат 10 мг лизина гидрохлорид 40 мг марганец (в форме сульфата гидрата) 250 мкг мед 100 мг медь (в форме сульфата пентагидрата) 250 мкг никотинамид 8 мг декспантенол 2 мг пиридоксина гидрохлорид 2 мг рибофлавин (в форме натрия фосфата) 1 мг солод 500 мг тиамина гидрохлорид 4 мг фолиевая кислота 150 мкг цианокобаламин 5 мкг цинк (в форме сульфата семиводного) 5 мг.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Профилактика железо- и витамин-B12-дефицитных состояний, обусловленных: — несбалансированным и неполноценным питанием — нарушением всасывания из ЖКТ — повышенной потребностью (в период беременности и лактации в период активного роста у детей и подростков).

Способ применения и дозы

Принимать внутрь после еды. Дети 1-3 лет -1/2 чайных ложки/сут; 4-6 лет - 1/2 чайных ложки 2 раза/сут; 7-12 лет - 1 чайная ложка 1-2 раза/сут; подростки -1 чайная ложка 3 раза/сут; взрослые - 1 чайная ложка 2 раза/сут. Во время менструаций, беременности и при лактации рекомендуется 1 чайная ложка 3 раза/сут.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Во время беременности и при лактации рекомендуется 1 чайная ложка 3 раза/сут.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет (безвредно и обусловлено наличием в составе препарата рибофлавина).

Условия хранения

В сухом месте