Инструкция по применению
Ферретаб комп Капсулы пролонгированного действия 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Австрия
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Железа фумарат+Фолиевая кислота
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 152.1 мг+0.5 мг

Действующее вещество

Железа фумарат+Фолиевая кислота

Состав

1 капсула содержит: Активное вещество: железа фумарат 163.56 мг, эквивалентно 152.1 мг сухого вещества, эквивалентно 50 мг железа, фолиевая кислота (вит. Вс) 540 мкг, эквивалентно 500 мкг сухого вещества. #### Вспомогательные вещества: * минитаблетки железа фумарата: лактозы моногидрат - 3.42 мг, кремния диоксид коллоидный - 600 мкг, магния стеарат - 600 мкг, сополимер метилметакрилата и этилакрилата (2:1) - 4.66 мг, * минитаблетка фолиевой кислоты: лактозы моногидрат - 24.21 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 24.25 мг, кремния диоксид коллоидный - 500 мкг, магния стеарат - 500 мкг. Состав корпуса капсулы: желатин - 36.4804 мг, краситель азорубин - 74.2 мкг, краситель хинолиновый желтый - 148.4 мкг, титана диоксид - 496 мкг. Состав крышечки капсулы: желатин - 24.3203 мг, краситель азорубин - 49.8 мкг, краситель хинолиновый желтый - 99.6 мкг, титана диоксид - 330.3 мкг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание и распределение Фолиевая кислота абсорбируется в основном из верхних отделов ЖКТ (двенадцатиперстной кишки), связывание с белками плазмы составляет 64%. #### Метаболизм и выведение Выделение железа происходит с калом, мочой и потом. Фолиевая кислота метаболизируется в печени и выделяется главным образом почками, а также частично с калом.

Показания

Лечение и профилактика железодефицитных состояний: * при беременности, * вследствие нарушения всасывания железа из ЖКТ, * вследствие длительных кровотечений, * вследствие несбалансированного и неполноценного питания.

Способ применения и дозы

Препарат назначают по 1 капс./сут. При выраженном дефиците железа или фолиевой кислоты дозу увеличивают до 2-3 капс./сут. Поддерживающую терапию следует продолжать как минимум 4 недели после достижения нормального уровня гемоглобина для нормализации ферритина сыворотки, отражающего запасы железа в организме. Препарат следует принимать натощак, запивая большим количеством жидкости.

Противопоказания

* заболевания, сопровождающиеся накоплением железа в организме (апластическая и гемолитическая анемия, талассемии, гемосидероз, гемохроматоз), * нарушения усвоения железа (сидероахрестическая анемия, свинцовая анемия, пернициозная анемия /недостаточность витамина B12/), * анемия, не связанная с дефицитом железа или фолиевой кислоты, * повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата Ферретаб комп. при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: в отдельных случаях &mdash, чувство переполнения желудка, дискомфорт, тошнота, рвота. Прочие: аллергические реакции. Препарат, как правило, хорошо переносится.

Передозировка

Симптомы: возможно усиление проявлений описанных побочных эффектов. Лечение: в первую очередь необходимо определение содержания железа и ферритина в сыворотке крови. При значительном превышении нормальных значений содержания ферритина в сыворотке назначают дефероксамин в соответствии с рекомендуемой производителем дозой.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении препарата Ферретаб комп. с антацидами абсорбция железа ухудшается. Одновременный прием с аскорбиновой кислотой способствует улучшению всасывания железа. При одновременном применении препарата Ферретаб комп. с аскорбиновой кислотой абсорбция железа улучшается. При совместном применении антибиотиков группы тетрациклинов и препарата Ферретаб, комп. нарушается абсорбция железа (данной комбинации следует избегать). Колестирамин, фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин, сульфасалазин, гормональные контрацептивы, антагонисты фолиевой кислоты, триметоприм, триамтерен, твердая пища, хлеб, сырые злаки, молочные продукты, яйца, чай снижают абсорбцию железа.

Особые указания

Перед началом терапии препаратом необходимо определение содержания железа и ферритина в сыворотке крови (т.е. документировать дефицит железа). Терапия препаратом Ферретаб комп. должна проводиться до нормализации картины крови (8-12 недель). При применении препарата возможно более темное окрашивание кала. На фоне применения препарата возможно получение ложноположительного результата бензидиновой пробы.