Инструкция по применению
Ферроцин Таблетки 500 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармзащита НПЦ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Калий-железо гексацианоферрат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 500 мг

Описание

Таблетки темно-синего цвета со светлыми вкраплениями.

Действующее вещество

Калий-железо гексацианоферрат

Состав

На одну таблетку:Действующее вещество: калий-железо гексацианоферрат - 500 мг, Вспомогательные вещества: каолин - 46,0 мг, повидон К-90 - 18,0 мг, кросповидон - 30,0 мг, кремния диоксид коллоидный - 3,0 мг, тальк - 3,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Ферроцин® не всасывается в кишечнике и полностью выводится из организма.

Показания

Интоксикация цезием, рубидием и таллием (в т.ч. продуктами деления урана), профилактика накопления радиоизотопов в организме при поступлении в желудочно-кишечный тракт с продуктами питания.

Способ применения и дозы

Внутрь.Взрослым и детям старше 14 лет - по 2 таблетки 3 раза в день, принимают ежедневно, курс лечения - до 30 дней (под контролем выведения радионуклидов), детям старше 3 лет по 1 таблетке 3 раза в день, в течение 5-10 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.Если у Вас одно из перечисленных заболеваний (состояний), перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о применении лекарственного препарата Ферроцин® при беременности и в период грудного вскармливания отсутствуют.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: запоры, диарея,Прочие: аллергические реакции.Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки препаратом Ферроцин® не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Снижает эффект препаратов, содержащих щелочные металлы, одновременное назначение с диуретиками может привести к гипокалиемии.В том случае, если Вы принимаете другие лекарства, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Прием препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.