# Инструкция по применению
# Ферровир раствор для внутримышечного введения 1,5% 5 мл 5 шт

## Характеристики




Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Россия
Производитель: Техномедсервис
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Дезоксирибонуклеат натрия с железом комплекс
Количество в упаковке: 5

## Описание

Прозрачная, желтая жидкость.

## Действующее вещество

Дезоксирибонуклеат натрия с железом комплекс

## Состав

Действующее вещество:Дезоксирибонуклеат натрия с железом комплекс - 75,24 мгВспомогательное вещество: вода для инъекций - до 5 мл

## Форма выпуска

Раствор для инъекций

**Фармакокинетика**

При внутримышечном введении рекомендуемой дозы, препарат быстро всасывается и распределяется в органах и тканях с участием эндолимфатического пути транспорта: обладает высокой тропностью к органам кроветворной системы: принимает активное участие в клеточном метаболизме, встраиваясь в клеточные структуры. В процессе ежедневного курсового применения обладает свойством кумулироваться в органах и тканях.Время достижения максимальной концентрации при одноразовом введении - 0,5 часа, после чего начинается снижение концентрации препарата в крови, связанное с его распределением в органах и тканях.При многократном введении препарата каждые 24 часа в течение 4 суток, наблюдается наибольшее его накопление в селезенке, лимфоузлах и костном мозге. После 5-го введения концентрация препарата при последующих введениях во всех органах и тканях не повышается, наблюдается его постепенное снижение.Метаболизм и выведениеПрепарат экскретируется из организма (в виде метаболитов), частично кишечником и в большей степени почками. Среднее время удержания препарата в органах и тканях - 72 часа. Время полуъыведения - 36 часов.

**Показания**

Ферровир® применяется в комбинированной терапии ВИЧ-инфицированных больных и больных СПИДом. ВИЧ-инфицированных больных с гепатитом С, ВИЧ-инфицированных больных с рецидивирующей герпетической инфекцией. При лечении больных клещевым энцефалитом, гепатитом С, герпесом.

**Способ применения и дозы**

При лечении ВИЧ-инфекции или СПИДа взрослым препарат назначается внутримышечно: 5 мл (15 мг/мл) раствора для внутримышечного введения (75 мг в пересчете на сухое вещество) 2 раза в сутки, в течение 14 дней. При необходимости, в зависимости от динамики количества Т4-лимфоцитов и уровня РНК ВИЧ-1 в периферической крови, через 1-1,5 месяца назначается повторный курс терапии.При лечении герпеса - 5 мл (15 мг/мл) раствора для внутримышечного введения 2 раза в сутки, в течение 10 дней.При лечении гепатита С Ферровир® вводится внутримышечно 2 раза в сутки по 5 мл (15 мг/мл) раствора для внутримышечного введения в течение 14 дней. В последующие 14 дней препарат вводится в той же суточной дозе через день.При клещевом энцефалите препарат вводится 2 раза в сутки по 5 мл (15 мг/мл) раствора для внутримышечного введения в течение 5-10 дней.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата, детский возраст до 18 лет.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

**Побочные действия**

Возможно кратковременное повышение температуры тела (до 38 °С), гиперемия и умеренная болезненность в месте инъекции.

**Передозировка**

Негативных явлений от передозировки не выявлено.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Умеренно усиливает действие антикоагулянтов.В комплексной терапии снижает токсичность и негативное воздействие применяемых препаратов (антибактериальных, противовирусных, противогрибковых и цитостатиков) по средствам цитопротекторных свойств и оптимизации обменных процессов гепатоцита.

**Особые указания**

Для уменьшения болезненности Ферровир® вводят внутримышечно медленно, в течение 1-2 мин.Раствор для инъекций следует полностью использовать сразу после вскрытия флакона, не допускается хранение открытых флаконов.Внутривенное введение препарата не допускается!Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Влияние препарата на способность к управлению транспортными средствами или движущимися механизмами не отмечено.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре от +4 °С до +20 °С.Хранить в местах недоступных для детей.