Инструкция по применению
Фестал драже 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Драже
Страна: Индия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гемицеллюлаза+Желчи компоненты+Панкреатин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 192 мг+ 25 мг+ 50 мг



Действующее вещество

Гемицеллюлаза+Желчи компоненты+Панкреатин

Состав

Панкреатин 192 мг, с ферментативной активностью: липазы 6000 ЕД FIP, амилазы 4500 ЕД FIP, протеаз 300 ЕД FIP, гемицеллюлаза 50 мг, желчи компоненты 25 мг. Вспомогательные вещества: натрия хлорид. Состав оболочки: целлацефат (целлюлозы ацетатфталат), этилванилин, масло касторовое, сахароза, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), желатин, декстроза жидкая (глюкоза жидкая), тальк, кальция карбонат, акации камедь, глицерол (глицерин), макрогол (полиэтиленгликоль 6000), титана диоксид.

Форма выпуска

Драже

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы при хроническом панкреатите в сочетании с билиарной недостаточностью вследствие различных патологических состояний, клинически проявляющихся нарушениями переваривания пищи, метеоризмом, склонностью к запорам. В составе комбинированной терапии при: диффузных заболеваниях печени - алкогольных и токсических поражениях печени, циррозе печени; больших потерях желчных кислот (у пациентов после холецистэктомии); нарушении циркуляции желчных кислот, наблюдающемся при дискинезии желчевыводящих путей, дисбактериозах, мальабсорбции; нарушении нейрогуморальной регуляции процессов желчеобразования и желчеотделения при хронических заболеваниях ЖКТ - хроническом гастрите, хроническом дуодените, хроническом холецистите. Для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании, а также при нарушениях жевательной функции, вынужденной длительной иммобилизации, малоподвижном образе жизни. Подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости.

Способ применения и дозы

Препарат следует принимать внутрь, не разжевывая, во время или сразу после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Взрослым назначают по 1-2 драже 3 раза /сут. Более высокие дозы назначает врач. Применение препарата у детей по назначению врача. Продолжительность лечения может варьировать от нескольких дней (при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешностей в диете) до нескольких месяцев или лет (при необходимости постоянной заместительной терапии). Перед рентгенологическим или ультразвуковым исследованием - по 2 драже 2-3 раза/сут в течение 2-3 дней до исследования.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата; острый панкреатит; обострение хронического панкреатита; печеночная недостаточность; печеночная кома или прекома; гепатит; гипербилирубинемия; механическая желтуха; желчнокаменная болезнь; эмпиема желчного пузыря; кишечная непроходимость; склонность к диарее; детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы). С осторожностью: муковисцидоз, беременность.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью следует применять препарат при беременности. Данные о безопасности применения препарата в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Побочные действия

Аллергические реакции: гиперемия кожных покровов, чиханье, слезотечение. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея, боли в животе (в т.ч. кишечная колика). При длительном применении в высоких дозах: возможно - гиперурикемия, гиперурикозурия. При применении в высоких дозах у детей: возможно - перианальное раздражение, раздражение слизистой оболочки полости рта.

Передозировка

Симптомы: гиперурикемия и гиперурикозурия. Лечение: отмена препарата и проведение симптоматической терапии.

Особые указания

С осторожностью следует применять препарат у пациентов с муковисцидозом.