**Инструкция по применению**
**Фестал Драже 40 шт**

## Характеристики




Форма выпуска: Драже
Страна: Индия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гемицеллюлаза+Желчи компоненты+Панкреатин
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 192 мг+ 25 мг+ 50 мг
Срок годности: 36.0

## Описание

Фестал® — трехкомпонентный ферментный лекарственный препарат, который способствует выработке собственных ферментов**. Фестал® - больше, чем панкреатин*. Имеет комбинированный состав из 3-х компонентов: панкреатин, желчь, гемицеллюлаза.Свойства лекарственного препарата Фестал®:• Способствует снятию симптомов нарушенного пищеварения:о Тяжести,о Вздутия,о Бурления. • Способствует выработке собственных ферментов**.Фестал® улучшает переваривание пищи при погрешностях в питании и облегчает переваривание углеводов, жиров и белков, что способствует более полному их всасыванию в тонком кишечнике. Источники:* Помимо панкреатина, действующими веществами Фестал® являются компоненты желчи и гемицеллюлаза.** Компоненты желчи в составе Фестал® способствуют выделению липазы поджелудочной железой.

## Действующее вещество

Гемицеллюлаза+Желчи компоненты+Панкреатин

**Состав**

Состав на 1 таблетку Состав ядра Действующие вещества: Панкреатин – 192,00 мг эквивалентно (липаза - 6000 FIP ЕД, амилаза - 4500 FIP ЕД, протеаза - 300 FIP ЕД); Гемицеллюлаза – 50,00 мг; Желчи компоненты – 25,00 мг. Вспомогательные вещества: натрия хлорид. Состав оболочки Вспомогательные вещества: целлацефат (целлюлозы ацетатфталат), этилванилин, касторовое масло, сахароза, желатин, декстроза жидкая \[декстроза, олиго- и полисахариды\] или глюкоза жидкая, тальк, кальция карбонат, акации камедь, глицерол (глицерин), макрогол (полиэтиленгликоль 6000), титана диоксид.

**Форма выпуска**

Драже

**Показания**

Недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы при хроническом панкреатите в сочетании с билиарной недостаточностью вследствие различных патологических состояний, клинически проявляющиеся нарушениями переваривания пищи, метеоризмом, склонностью к запорам, в составе комбинированной терапии при: * диффузных заболеваниях печени * алкогольных и токсических поражениях печени, циррозе печени; * больших потерях желчных кислот (у пациентов после холецистэктомии); * нарушении циркуляции желчных кислот, наблюдающемся при дискинезиях желчевыводящих путей, дисбактериозах, мальабсорбции; * нарушении нейрогуморальной регуляции процессов желчеобразования и желчеотделения при хронических заболеваниях желудочно-кишечного 3 тракта * хроническом гастрите, хроническом дуодените, хроническом холецистите. * Для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией желудочно-кишечного тракта в случае погрешностей в питании, а также при нарушениях жевательной функции, вынужденной длительной иммобилизации, малоподвижном образе жизни. Подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости.

**Способ применения и дозы**

Внутрь. Препарат принимают внутрь, не разжевывая, во время или сразу после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Назначают по 1-2 таблетки 3 раза в сутки. Более высокие дозы назначаются только врачом. Дозировку и режим дозирования у детей определяет врач. Продолжительность лечения может варьировать от нескольких дней (при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешностей в диете) до нескольких месяцев или лет (при необходимости постоянной заместительной терапии). Перед рентгенологическим или ультразвуковым исследованием - по 2 таблетки 2-3 раза в сутки за 2-3 дня до исследования

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, печеночная недостаточность, печеночная кома или прекома, гепатит, гипербилирубинемия, механическая желтуха, желчнокаменная болезнь, эмпиема желчного пузыря, кишечная непроходимость, склонность к диарее, детский возраст до 3-х лет, беременность и период грудного вскармливания.

**Передозировка**

Симптомы передозировки - гиперурикемия и гиперурикозурия. При появлении симптомов передозировки следует отменить препарат и провести симптоматическую терапию.

**Условия хранения**

В сухом месте