# Инструкция по применению
# Фибро-Вейн раствор для внутривенного введения 1% 2мл 5шт

## Характеристики




Форма выпуска: Ампулы
Страна: Великобритания
Производитель: СТД Фармасьютикал Продактс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Натрия тетрадецилсульфат
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 1%

## Описание

Раствор для в/в введения прозрачный, бесцветный.

## Действующее вещество

Натрия тетрадецилсульфат

## Состав

Натрия тетрадецил сульфат, бензиловый спирт 20 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат 7.5 мг, калия дигидрофосфат 1 мг, натрия гидроксид до pH 7.65-7.75, вода д/и до 1 мл.

## Форма выпуска

Ампулы

**Показания**

Консервативная склеротерапия при начальных и неосложненных формах умеренно выраженного варикозного расширения поверхностных вен нижних конечностей при установленной хорошей проходимости глубоких и коммуникативных вен, а также при рассыпном типе варикозного поражения, когда оперативное удаление всех варикозных участков практически невыполнимо. Склеротерапия отключенных варикозных притоков подкожных вен в составе комплексного лечения или в послеоперационном периоде. Варикозное расширение вен пищевода. Кожные бугорчатые ангиомы у детей, липомы, кисты сальных желез.

**Способ применения и дозы**

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

**Противопоказания**

Острый тромбоз и непроходимость глубоких вен голени и бедра, сопутствующий острый тромбофлебит, обширное и выраженное варикозное расширение вен (в т.ч. глубоких) с недостаточностью клапанов, варикоз на фоне новообразований органов брюшной полости и малого таза, мигрирующие флебиты, облитерирующий эндартериит, флебосклероз, лихорадка, аллергические заболевания и состояния, флегмона, сахарный диабет, токсический тиреотоксикоз, бронхиальная астма, онкологические заболевания, острые инфекции, туберкулез, сепсис, нарушение клеточного состава крови, острые респираторные или кожные заболевания, общие заболевания, требующие соблюдения постельного режима, болезни сердца с явлениями декомпенсации, беременность, период лактации, повышенная чувствительность к натрия тетрадецилсульфату.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

**Побочные действия**

Местные реакции: гиперемия, жжение, болезненность, пигментация, интраварикозная гематома в месте введения, восходящий флебит с или без сопутствующего перифлебита. Системные реакции: головная боль, тошнота, рвота, аллергические реакции (крапивница, бронхоспазм, лихорадка, анафилактический шок), тромбоз легочных вен, системные инфекции (вследствие некроза кожи в месте инъекции). При случайном в/а введении - облитерация приводящего сосуда (вплоть до необходимости проведения ампутации конечности), тромбоэмболии (даже через 4 мес после процедуры), при паравенозном - развитие некроза мягких тканей и системной инфекции.

**Особые указания**

Склерозирование вен проводят с осторожностью, при абсолютной уверенности в проходимости глубоких и коммуникативных вен нижних конечностей и в присутствии врача, имеющего опыт проведения склеротерапии. Следует избегать экстравазального (паравенозного) и в/а введения.