Инструкция по применению
Фильтрум-СТИ Таблетки 400 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Авва Рус
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лигнин гидролизный
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 400 мг
Срок годности: 24

Описание

Капсуловидные двояковыпуклые таблетки темно-коричневого цвета с вкраплениями от серого до коричневого цвета с риской.

Действующее вещество

Лигнин гидролизный

Состав

1 таблетка содержит: Действующее вещество: лигнин гидролизный (в пересчете на 100% вещество) -400,0 мг, Вспомогательные вещества: повидон К17 (поливинил пирролидон) - 54,66 мг, тальк - 13,00 мг, кальция стеарат - 9,75 мг, кремния диоксид коллоидный - 6,50 мг, кроскармеллоза натрия - 6,50 мг, целлюлоза микрокристаллическая до получения таблетки массой 600,0 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве дезинтоксикационного средства у взрослых и детей при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения: \- острые отравления лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и другими ядами, * комплексное лечение пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза, дизентерии, диспепсии, * гнойно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией, * гипербилирубинемия и гиперазотемия (печеночная и почечная недостаточность), * пищевая и лекарственная аллергия, * профилактика хронических интоксикаций у работников вредных производств.

Способ применения и дозы

Внутрь, желательно после предварительного измельчения, запивая водой за час до еды и приема других лекарственных средств. Доза препарата зависит от возраста, массы тела и тяжести заболевания, препарат принимается 3 - 4 раза в день, средняя разовая доза составляет для детей: до 1 года - 1/2 таблетки, 1-3 года - 1/2-1 таблетку, 4-7 лет - 1 таблетку, 7-12 лет - 1-2 таблетки, для взрослых - 2-3 таблетки. Длительность лечения при острых состояниях 3-5 дней, при аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях до 14-21 дней. Повторные курсы лечения спустя 2 недели по рекомендации врача.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата. Не желательно использовать препарат при обострении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, атонии кишечника.

Побочные действия

Редко - аллергические реакции, запор. Длительное применение может приводить к нарушению всасывания витаминов, кальция, в связи с чем рекомендуется профилактический прием поливитаминов и препаратов кальция.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь лекарств.

Особые указания

Препарат может использоваться в комплексной терапии с другими лекарственными средствами, при соблюдении правила раздельного приема.

Срок хранения после открытия

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В сухом месте