Инструкция по применению
Финалгель Гель для наружного применения 35 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Германия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пироксикам
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60



Действующее вещество

Пироксикам

Состав

1 г пироксикам 5 мг. Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, изопропанол, макрогола глицерилкокоат (цетиол HE), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), натрия гидроксид, натрия дисульфит (натрия метабисульфит), калия дигидрофосфат, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Финалгель не предоставлены.

Показания

Болевой синдром при: — спортивных травмах (ушибы, вывихи, растяжения, повреждения связок) — анкилозирующем спондилоартрите — остеоартрозе — ревматоидном артрите — хроническом ювенильном артрите — тендините — тендовагините — плечелопаточном синдроме.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет гель наносят на кожу над пораженной областью в дозе 1 г (примерно соответствует размеру лесного ореха) 3-4 раза/сут. Продолжительность лечения зависит от выраженности симптомов и в среднем составляет 2-3 недели при тендинитах, тендовагинитах, плечелопаточном синдроме, 1-2 недели - при спортивных травмах.

Противопоказания

— почечная недостаточность — детский возраст до 14 лет — III триместр беременности — повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП — повышенная чувствительность к пироксикаму или другим компонентам препарата. С осторожностью следует назначать препарат пациентам с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, рецидивирующим полипозом носа и околоносовых пазух, хроническими обструктивными заболеваниями легких или хроническими инфекциями дыхательных путей.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению в III триместре беременности. В I и II триместрах препарат следует применять с осторожностью. Пироксикам в незначительных количествах проникает в грудное молоко. Поэтому не рекомендуется применять Финалгель в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Местные реакции: раздражение кожи в месте нанесения препарата (воспаление, покраснение, шелушение). Аллергические реакции: крапивница, зуд.

Передозировка

Симптомы: в единичных случаях возможно возникновение системных побочных эффектов (головная боль, тошнота, боли в эпигастрии, одышка; описан один случай развития интерстициального нефрита с функциональной почечной недостаточностью и нефротическим синдромом). Лечение: препарат следует отменить. Проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими препаратами препарата Финалгель не описано.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на поврежденные кожные покровы и в глаза.

Условия хранения

В сухом месте