**Инструкция по применению**
**Фитолизин Капсулы 40 шт**

## Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Польша
Производитель: Акрихин
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Экстракты сгущенные растений+масла
Количество в упаковке: 40




## Описание

Мягкие капсулы от темно-коричневого до черного цвета продолговатой формы со швом посередине, заполненные густой маслянистой массой с характерным запахом.

## Действующее вещество

Экстракты сгущенные растений+масла

## Состав

Препарат Фитолизин, капсулы содержит:активные компоненты: Фитолизин экстракт густой (экстрагент - этанол 45% (об/об) ((2.8 - 4):1)) из смеси лекарственного растительного сырья: золотарника обыкновенного травы, хвоща травы, горца птичьего травы, пырея ползучего корневищ, лука репчатого луковиц чешуи наружной сухой, березы листьев, пажитника сенного семян, петрушки кудрявой корней, любистока лекарственного корневищ и корней (7/6/6/5/4/4/4/2/2) - 317,81 мг,вспомогательные вещества, содержимое капсулы: цитруса китайского плодов масло, шалфея мускатного травы масло, мяты перечной травы масло, сосны обыкновенной хвои масло, макрогол 400, макрогол 4000,оболочка капсулы: желатин, сорбитол жидкий частично дегидрированный (Е 420), вода очищенная.

## Форма выпуска

Капсулы

**Показания**

Препарат Фитолизин применяется в составе комплексного лечения и для профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей и нефроуролитиаза (мочекаменной болезни с образованием мелких конкрементов, так называемого «песка») у взрослых старше 18 лет.

**Способ применения и дозы**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.Рекомендуемая доза: по 2 капсулы 3-4 раза в сутки.Не рекомендуется применять без врачебной консультации более 2-6 недель. Принимают внутрь. Капсулы следует принимать целиком, запивая стаканом воды.Если улучшение не наступает, симптомы сохраняются в период применения препарата или состояние ухудшается, следует обратиться к врачу.Во время применения препарата следует принимать большое количество жидкости.

**Противопоказания**

Не принимайте препарат Фитолизин:

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.В связи с отсутствием данных о генотоксическом и тератогенном действии ингредиентов препарата, не рекомендуется его применение при беременности и в период грудного вскармливания.Если вы забеременели, то обсудите со своим лечащим врачом, превышает ли ожидаемая польза от применения лекарственного препарата Фитолизин риск вредного воздействия на ребенка. Препарат Фитолизин не следует применять во время беременности, если только клиническое состояние женщины не требует проведения такого лечения.Во время приема препарата Фитолизин грудное вскармливание следует прекратить.Отсутствуют данные о влиянии на фертильность (способности к зачатию).

**Побочные действия**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Фитолизин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.ИммунитетЧастота неизвестна: аллергические реакции (кожный зуд, кожная сыпь, крапивница, аллергический ринит (насморк), отек лица).Нервная системаЧастота неизвестна: головокружение.Желудок и кишечникЧастота неизвестна: тошнота, рвота, диарея (жидкий стул), вздутие живота.Кожа и подкожные тканиЧастота неизвестна: фотосенсибилизация (повышение чувствительности к солнечным лучам).Частота развития возможных нежелательных реакций определяется в соответствии с критериями, приведенными ниже:очень часто - могут возникать более чем у 1 человека из 10,часто - могут возникать не более чем у 1 человека из 10,нечасто - могут возникать не более чем у 1 человека из 100,редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 1000,очень редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000, включая единичные случаи,неизвестно - исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно.Сообщение о нежелательных реакцияхЕсли у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через www.roszdravnadzor.ru. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

**Передозировка**

Не сообщалось о случаях передозировки препаратом Фитолизин.Если вы забыли принять препарат ФитолизинНе принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную капсулу.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.До настоящего момента не отмечено лекарственных взаимодействий.В связи с диуретическим действием препарата следует учитывать более быстрое выведение других одновременно принимаемых лекарственных средств.Препарат может:

**Особые указания**

Препарат Фитолизин содержит 126,64 мг сорбитола в одной капсуле. Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Отсутствуют данные о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

**Условия хранения**

Храните препарат в недоступном и не видном для детей месте.Хранить при температуре не выше 25 °C.