Инструкция по применению
Физиотенз Таблетки покрытые пленочной оболочкой 0,2 мг 28 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Моксонидин
Количество в упаковке: 28
Дозировка действующего вещества: 0,2 мг



Описание

Таблетки Физиотенз - это селективный агонист имидазолиновых рецепторов. Антигипертензивный препарат.

Действующее вещество

Моксонидин

Состав

Одна таблетка содержит активное вещество – моксонидин 0,2 мг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, повидон, кросповидон, магния стеарат, состав оболочки: гипромеллоза, этилцеллюлоза, макрогол 6000, тальк, железа оксид красный, титана диоксид.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Артериальная гипертензия

Способ применения и дозы

Внутрь. В большинстве случаев начальная доза Физиотенза составляет 0,2 мг в сутки, максимальная суточная доза, которую следует разделить на 2 приема, составляет 0,6 мг. Максимальная однократная доза составляет 0,4 мг. Начальная суточная доза для пациентов с почечной недостаточностью (КК 30-60 мл/мин) и пациентов, находящихся на гемодиализе - 0,2 мг. Максимальная суточная доза - 0,4 мг.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано в период беременности и лактации.

Побочные действия

Головокружение, головная боль, общая слабость, сонливость, нарушение сна, повышенная утомляемость чрезмерное снижение АД, ортостатическая гипотензия сухость во рту, тошнота ангионевротический отек, периферические отёки.

Передозировка

Симптомы: головная боль, седативный эффект, сонливость, чрезмерно выраженное снижение АД, головокружение, общая слабость, брадикардия, сухость во рту, рвота, усталость и боль в желудке. Потенциально возможны также кратковременное повышение АД, тахикардия, гипергликемия. Лечение: специфических антидотов не существует. Антагонисты альфа-адренорецепторов могу уменьшать или устранять парадоксальную артериальную гипертензию при передозировке моксонидином.

Взаимодействие с другими препаратами

Происходит взаимное усиление действия Физиотенза® при совместном применении с другими гипотензивными средствами. Физиотенз® усиливает брадикардию и выраженность отрицательного ино- и дромотропного действия бета-адреноблокаторов. Результирующее влияние присоединения альфа-адреноблокаторов к терапии определяется их дозой. При назначении Физиотенза® с гидрохлортиазидом, глибенкламидом (глибуридом) или дигоксином фармакокинетическое взаимодействие отсутствует. Трициклические антидепрессанты могут снизить эффективность антигипертензивных средств центрального действия. Физиотенз® умеренно усиливает сниженную когнитивную способность у пациентов, принимающих лоразепам. Назначение Физиотенза® совместно с бензодиазепинами может сопровождаться усилением седативного эффекта последних. Физиотенз® усиливает угнетающее действие на центральную нервную систему анксиолитиков, барбитуратов и этанола. При назначении Физиотенза® совместно с моклобемидом фармакодинамическое взаимодействие отсутствует.

Особые указания

При необходимости отмены одновременно принимаемых бета-адреноблокаторов и Физиотенза®, сначала отменяют бета-адреноблокаторы и, лишь через несколько дней, Физиотенз®. Не рекомендуется назначать трициклические антидепрессанты одновременно с моксонидином. Во время лечения необходим регулярный контроль АД, ЧСС и ЭКГ. Физиотенз® может назначаться с тиазидными диуретиками, ингибиторами АПФ и блокаторами «медленных» кальциевых каналов. Из-за отсутствия опыта применения с осторожностью назначают при паркинсонизме, эпилепсии, глаукоме, депрессии, «перемежающейся» хромоте, болезни Рейно, гемодиализе. Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.