Инструкция по применению
Фламин-Вифитех Таблетки 50 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бессмертника песчаного цветков сумма флавоноидов
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 50 мг

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, желтого цвета или желтого с буроватым оттенком, с малозаметными вкраплениями, ароматического запаха.

Действующее вещество

Бессмертника песчаного цветков сумма флавоноидов

Состав

Активный компонент: Фламин (с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутин 26 %) - 0,05 г. Вспомогательные вещества: (сахар молочный (лактоза), крахмал кукурузный, магния карбонат основной, кальция стеарат) - достаточное количество до получения таблетки массой 0,18 г

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Хронический холецистит, дискинезии желчных путей.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды (с небольшим количеством теплой воды). При необходимости – по 2 таблетки 2-3 раза в день. Курс лечения 10-40 дней.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, холелитиаз, обтурационная желтуха, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения, возраст до 12 лет, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. С осторожностью: артериальная гипертензия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять в период беременности и лактации в связи с отсутствием специальных исследований.

Побочные действия

Аллергические реакции; повышение артериального давления (у больных артериальной гипертензией). Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных реакций. Препарат следует отменить. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Повышают активность метронидазола и аминохинола при лечении лямблиоза.

Особые указания

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.