Инструкция по применению
Флавитал Таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Финляндия
Производитель: Ханкинтатуку
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Компоненты препарата Флавитал направлены на нормализацию работы организма и профилактику воспалений и новообразований за счёт мягкого воздействия растительных компонентов, которые обладают следующими полезными свойствами: ингибируют ферменты циклооксигеназы-1,2, липоксигеназу-5, подавляя выработку медиаторов воспаления простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов, обладают выраженным противовоспалительным и болеутоляющим действием, превосходя по активности ряд нестероидных противовоспалительных средств, не имеют их побочных эффектов, проявляют выраженную антиоксидантную активность, препятствуют образованию свободных радикалов, уменьшают их концентрацию в мембранах, защищают молекулы ДНК от переокисления, обладают капилляроукрепляющим, венотонизирующим и ангиопротекторным действием, проявляют кардио-, гепато-, нейро-протекторные свойства, обладают противовоспалительным, антиаллергическим действием, связывают и выводят токсины, радионуклиды из организма, защищают его от канцерогенных веществ, проявляют противовирусное, антибактериальное, иммуномодулирующее действие, доказано, что ингибиторы циклооксигеназы предотвращают развитие рака кожи, молочной железы, пищевода, мочевого пузыря, простаты, результативно используются, т.к. подавляют выработку простаноидов, усиливающих пролиферацию раковых клеток, ангиогенез, угнетающих апоптоз, предупреждают развитие онкологических заболеваний, ингибируют онкогенез, повышают функциональную активность естественных киллерных клеток, усиливают эффекторные эндогенные механизмы, осуществляющие противоопухолевую защиту, как на клеточном, так и на

гуморальном уровнях, корректируют нарушенный баланс цитокинов, повышают функциональную активность клеток лимфоузлов и нейтрофилов, вследствие чего проявляется противоопухолевое и антиметастатическое действие, предотвращают покрытие фибрином опухолевых клеток, делая их более доступными для воздействия цитостатических препаратов и естественных киллерных клеток, повышая антиметастатический эффект основной химиотерапии, их ингибирующее влияние на процесс метастазирования является следствием угнетения ими неоангиогенеза, повышают противоопухолевую активность цитостатиков, повышают эффективность цитостатической терапии, ослабляют токсическое влияние цитостатиков на процесс кроветворения (лейкопению), усиливают детоксикационную функцию печени, способствуя обезвреживанию и удалению токсинов из организма, предупреждают окислительное повреждение клеток сердца, легких, почек, селезенки, подавляют рост клеток рака желудка, кишечника, угнетают ангиогенез, запускают апоптоз (гибель) раковых клеток, способны значительно снижать токсичность и отрицательные побочные эффекты от химио-, лучевой терапии, ускорять восстановление показателей крови, иммунной системы после перенесенных операций. Свойства компонентов. Растение Шлемник байкальский много веков используется в Китайской народной медицине в качестве средства для лечения жара, воспалений, кожных и респираторных инфекций, вирусных гепатитов, нефритов, детских пневмоний, бронхиальной астмы и др. В данном препарате экстракт Шлемника байкальского был получен по оригинальной запатентованной технологии. В его состав входят более 75% флавоноидов с незамещенным В-кольцом (байкалин, вогонин и его глюкуронид, ороксилин А и его глюкуронид, хризин и его глюкуронид, байкалеин, скутелларин, норвогонин и др.). В настоящее время доказано, что данный экстракт ингибирует ферменты циклооксигеназы-1,2, липоксигеназу-5, подавляя выработку медиаторов воспаления простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов, обладает выраженным противовоспалительным и болеутоляющим действием, превосходя по активности известные нестероидные лекарственные препараты (убупрофен, индометацин), но не имеет их побочных эффектов. Установлено, что ингибиторы циклооксигеназы предотвращают развитие рака кожи, молочной железы, пищевода, мочевого пузыря, простаты, результативно используются в комплексном лечении, т.к. подавляют выработку простаноидов, усиливающих пролиферацию раковых клеток, ангиогенез, угнетающих апоптоз. Доказано, что байкалин предупреждает развитие рака, ингибирует онкогенез, проявляет противовирусное, антибактериальное, антиоксидантное, иммуномодулирующее действие. Флавоноиды Шлемника повышают функциональную активность естественных киллерных клеток, усиливают эффекторные эндогенные механизмы, осуществляющие противоопухолевую защиту, как на клеточном, так и на гуморальном уровнях, корректирует нарушенный баланс цитокинов, повышают функциональную активность клеток лимфоузлов и

нейтрофилов, вследствие чего проявляется противоопухолевое и антиметастатическое действие экстракта. Байкалин нормализует уровень кортизола в плазме крови животных с опухолями, повышает чувствительность гипоталамуса к регуляторным сигналам, при этом понижается возможность опухолевой ткани получать основной продукт питания – глюкозу, что приводит к торможению роста бластом. Деструктивные изменения в лимфоидной ткани, наблюдаемые под воздействием глюкокортикоидов, уменьшаются, что снижает возможность проникновения опухолевых клеток и развития метастазов. Подавление экстрактом Шлемника процесса диссеминации опухоли прямо коррелирует со степенью снижения активности процессов спонтанной и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов. Байкалин предотвращает покрытие фибрином опухолевых клеток, делая их более доступными для воздействия цитостатических препаратов и естественных киллерных клеток, повышая таким образом антиметастатический эффект терапии. Кроме того, ингибирующее влияние флавоноидов на процесс метастазирования является следствием угнетения ими неоангиогенеза. Эффективность использования в онкологической практике флавоноидов связана с их антиоксидантной активностью, что препятствует образованию свободных радикалов, уменьшает их концентрацию в мембранах, защищая молекулы ДНК от переокисления, повышая противоопухолевую активность цитостатиков. К тому же, экстракт Шлемника, повышая эффективность цитостатической терапии, ослабляет токсическое влияние цитостатиков на процесс кроветворения (лейкопению). В реализации данного эффекта принимает участие байкалин, содержащий остаток глюкуроновой кислоты, которая избирательно стимулирует процессы костномозгового кроветворения в условиях гипоплазии костного мозга, развивающейся под воздействием цитостатиков. Флавоноиды также усиливают детоксикационную функцию печени, способствуя обезвреживанию и удалению токсинов из организма. Акация катеху широко используется в народной медицине Индии и других стран Азии для лечения желудочно-кишечных заболеваний, диареи, остановки кровотечений, а ее экстракты обладают спазмолитическим, антигипертензивным, тромболитическим, противовоспалительным действием. Данный экстракт Акации катеху получен по оригинальной запатентованной технологии и содержит флаваны (катехин,эпикатехин и др.), которые обладают выраженным противовоспалительным, противоязвенным, гепатопротекторным, антиканцерогенным действием. Установлено, что катехин и эпикатехин обладают противовирусной, антиоксидантной активностью и с успехом применяются в лечении вирусных гепатитов, гиперплазий, вызванных вирусом папилломы, предупреждают окислительное повреждение клеток сердца, легких, почек, селезенки, подавляют рост клеток рака желудка, кишечника, угнетают ангиогенез, запускают апоптоз раковых клеток. В экстракте листьев зеленого чая также содержатся производные катехина (эпигаллокатехин, эпигаллокатехин-3-

галлат, эпикатехин-3-галлат), которые обладают мощным антиоксидантным действием, защищают мембраны клеток от агрессивных кислородных и перекисных радикалов, блокируют неоангиогенез, избирательно подавляют пролиферацию раковых клеток и вызывают апоптоз. Экстракт кожуры винограда содержит богатый комплекс полифенольных соединений, флавоноидов (ресвератрол, кверцетин), антоцианов, проантоцианидинов и др., которые проявляют ангио-, кардио-, гепато-, нейро-протекторные свойства, обладают противовоспалительным, антиоксидантным, антиаллергическим, гипохестеринемическим, иммуномодулирующим действием, выводят токсины, радионуклиды из организма, защищают его от канцерогенных веществ.

Состав

Экстракт шлемника байкальского, экстракт корней акации катеху, экстракт кожуры винограда, биофлавоноиды цитрусовых, экстракт зеленого чая, экстракт коры сосны, целлюлоза микрокристаллическая (Е460), кремния диоксид (Е551), натрия карбоксиметилцеллюлоза (Е466), магния стеарат (Е470).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - источника флавонов, содержащей катехины.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1/2 таблетки в день во время еды. Продолжительность приема -1-2 месяца. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.