Инструкция по применению
Флебавен Таблетки 1000 мг 32 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гесперидин+Диосмин
Количество в упаковке: 32
Дозировка действующего вещества: 1000 мг

Описание

Капсуловидные, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой светлого оранжево-розового цвета.Вид таблеток на изломе: шероховатая масса от желтого до коричневато-желтого цвета с пленочной оболочкой светлого оранжево-розового цвета.

Действующее вещество

Гесперидин+Диосмин

Состав

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:Ядро: очищенная микронизированная флавоноидная фракция, субстанция - гранулы 1226,00 мг [Действующее вещество субстанции - гранул: очищенная микронизированная флавоноидная фракция [диосмин (90 %) 900 мг + флавоноиды в пересчете на гесперидин (10 %) 100 мг] 1000,00 мгВспомогательные вещества субстанции - гранул: целлюлоза микрокристаллическая (тип 101), повидон (К30)]Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (тип 105), карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), тальк, магния стеаратОболочка пленочная: пленкообразующая смесь 1 , краситель железа оксид красный (Е 172), краситель железа оксид желтый (Е 172) 1Состав пленкообразующей смеси: гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), тальк, пропиленгликоль.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Препарат Флебавен® преимущественно выводится через кишечник. Почками, в среднем, выводится около 14 % принятой дозы препарата. Период полувыведения составляет 11 часов.Препарат подвергается активному метаболизму, что подтверждается присутствием феноловых кислот в моче.

Показания

Терапия симптомов венозно-лимфатической недостаточности: ощущение тяжести в ногах, боль, «усталость» ног.Симптоматическая терапия острого геморроя.

Способ применения и дозы

Внутрь. Таблетки следует проглатывать, запивая водой.Рекомендуемая доза при венозно-лимфатической недостаточности — 1 таблетка в сутки, предпочтительно утром, во время приема пищи.Риска на таблетке предназначена исключительно для деления с целью облегчения проглатывания.Продолжительность курса лечения может составлять несколько месяцев (вплоть до 12 месяцев). В случае повторного возникновения симптомов по рекомендации врача курс лечения может быть повторен. Рекомендуемая доза при остром геморрое — 1 таблетки в сутки (по 1 таблетке утром, днем и вечером) в течение 4-х дней, затем по 2 таблетки в сутки (по 1 таблетке утром и вечером) в течение последующих 3-х дней.Рекомендуемая доза при хроническом геморрое — 1 таблетка в сутки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим или к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.Не рекомендуется прием препарата в период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

БеременностьЭксперименты на животных не выявили тератогенных эффектов.До настоящего времени не было сообщений о каких-либо побочных эффектах при применении препарата беременными женщинами.Период грудного вскармливанияИз-за отсутствия данных относительно выведения препарата с грудным молоком, женщинам в период грудного вскармливания не рекомендуется прием препарата.

Побочные действия

Классификация частоты развития побочных эффектов, рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):очень часто ⩾ 1/10часто от ⩾ 1/100 до < 1 /10нечасто от ⩾ 1/1000 до < 1/100редко от ⩾ 1/10000 до < 1/1000очень редко < 1/10000частота неизвестна не может быть оценена на основе имеющихся данных. Со стороны центральной нервной системы:редко: головокружение, головная боль, общее недомогание.Со стороны пищеварительной системы:часто: диарея, диспепсия, тошнота, рвота.нечасто: колит.частота неизвестна: боль в животе.Со стороны кожных покровов:редко: кожная сыпь, кожный зуд, крапивница.частота неизвестна: изолированный отек лица, губ, век. В исключительных случаях ангионевротический отек.Информируйте врача о появлении у вас любых, в том числе не упомянутых в данной инструкции, нежелательных реакций и ощущений, а также об изменении лабораторных показателей на фоне терапии.

Передозировка

Случаев передозировки не описано.При передозировке препарата Флебавен®немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Взаимодействие с другими препаратами

Не отмечалось.Следует информировать лечащего врача обо всех принимаемых вами лекарственных препарараратах.

Особые указания

Перед тем как начать принимать препарат Флебавен®, рекомендуется проконсультироваться с врачом. При обострении геморроя применение препарата Флебавен® не заменяет специфического лечения других анальных нарушений. Продолжительность лечения не должна превышать сроки, указанные в разделе «Способ применения и дозы». В том случае, если симптомы не исчезают после рекомендуемого курса терапии, следует пройти осмотр у проктолога, который подберет дальнейшую терапию. При наличии нарушений венозного кровообращения максимальный эффект лечения обеспечивается сочетанием терапии со здоровым (сбалансированным) образом жизни: желательно избегать долгого пребывания на солнце, длительного пребывания на ногах, а также рекомендуется снижение избыточной массы тела. Пешие прогулки и, в некоторых случаях, ношение специальных чулок, способствует улучшению циркуляции крови.Незамедлительно обратитесь к врачу, если ваше состояние ухудшилось или в процессе лечения улучшения не наступило.Влияние на способность выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (например, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами)Не влияет.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C, в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.