Инструкция по применению
Флебофа Таблетки 600 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диосмин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 600 мг
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Диосмин

Состав

1 таблетка содержит:Активное вещество: диосмин в пересчете на сухое вещество 600 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Быстро всасывается из ЖКТ, обнаруживается в плазме через 2 ч после приема. Cmax в плазме крови достигается через 5 ч после приема. Равномерно распределяется и накапливается во всех слоях стенки полых вен и подкожных вен нижних конечностей, в меньшей степени - в венах почек, печени, легких и других тканях. Избирательное накопление диосмина и/или его метаболитов в венозных сосудах достигает максимума через 9 ч после приема и сохраняется в течение 96 ч. Выводится с мочой - 79%, с калом - 11%, с желчью – 2.4%.

Показания

Варикозное расширение вен нижних конечностей, хроническая лимфовенозная недостаточность нижних конечностей, геморрой, нарушения микроциркуляции.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь. В зависимости показаний суточная доза составляет 600-1800 мг. Длительность применения зависит от показаний и схемы лечения.

Противопоказания

Детский и подростковый возраст до 18 лет, лактация (грудное вскармливание), повышенная чувствительность к диосмину.

Применение при беременности и кормлении грудью

До настоящего времени в клинической практике не было сообщений о каких-либо побочных эффектах при применении у беременных. Не рекомендуется применение во время грудного вскармливания, т.к. отсутствуют данные о выделении диосмина с грудным молоком.В экспериментальных исследованиях не было выявлено тератогенного действия на плод.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: диспепсия.Со стороны ЦНС: головная боль. Прочие: в редких случаях - аллергические реакции (требующие перерыва в лечении).

Передозировка

Симптомы передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых эффектов взаимодействия с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания

Лечение острого приступа геморроя проводят в комплексе с другими препаратами.В составе некоторых лекарственных препаратов диосмин используют в комбинации с гесперидином.

Условия хранения

Беречь от детей