Инструкция по применению
Флебофа Таблетки 600 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диосмин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 600 мг



Описание

Продолговатые двояковыпуклые таблетки с риской с одной стороны, от серовато-коричневого до серовато-желтого цвета, допускаются вкрапления более светлого и темного оттенков.

Действующее вещество

Диосмин

Состав

на 1 таблетку:Активное вещество: диосмин в пересчете на безводное вещество - 600 мг,Вспомогательные вещества: желатин - 50,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 40,0 мг, магния стеарат - 10,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая - до 1000 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Диосмин быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Обнаруживается в плазме крови через 2 часа после приема. Биодоступность препарата после приема внутрь составляет примерно 40-57,9%. Часть препарата метаболизируется бактериями слепой кишки с образованием гиппуровой и бензойной кислот.Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 5 часов после приема. Препарат накапливается во всех слоях стенки полых вен и подкожных вен нижних конечностей, в меньшей степени - в почках, печени и легких и других тканях. Объем распределения препарата составляет 62,1 л. Максимальное избирательное накопление диосмина и /или его метаболитов в стенке венозных сосудов отмечается через 9 часов после приема и сохраняется в течение 96 часов.Диосмин быстро метаболизируется в печени. Основной метаболит - гидроксифенилпропионовая кислота. Метаболиты диосмина выводятся преимущественно почками в форме конъюгатов с глюкуроновой кислотой. 79% принятого диосмина выводится почками, 11% - кишечником, 2,4 % - с желчью. Отмечается энтерогепатическая циркуляция препарата. После приема диосмина, меченного радиоактивным изотопом, примерно 86% препарата выводится почками и кишечником в течение 48 часов.

Показания

Варикозное расширение вен нижних конечностей (устранение симптомов), Хроническая лимфовенозная недостаточность нижних конечностей (устранение симптомов),Острый геморрой (в комплексной терапии для облегчения симптомов), Нарушения микроциркуляции (например, при идиопатических отеках).

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для приема внутрь.При варикозном расширении вен нижних конечностей и хронической лимфовенозной недостаточностиПрепарат назначают по 1 таблетке в сутки утром натощак. Продолжительность терапии обычно составляет 2 месяца. При тяжелых формах хронической лимфовенозной недостаточности (отеки, боли, судороги и т.д.) лечение может быть более продолжительным (общая длительность непрерывной терапии не должна превышать трех-четырех месяцев). Курсы лечения препаратом Флебофа повторяют через 2-3 месяца.Для лечения хронической лимфовенозной недостаточности во время II и III триместра беременности препарат назначают по 1 таблетке 1 раз в день. Необходимо прекратить прием препарата за 2-3 недели до родов.При обострении геморроя Препарат назначают по 2-3 таблетки в сутки во время еды в течение 7 дней. Далее при необходимости можно продолжить прием препарата по 1 таблетке 1 раз в день в течение 1-2 месяцев.При нарушениях микроциркуляции Препарат назначают по 1 таблетке в сутки утром натощак. Продолжительность терапии обычно составляет 1-2 месяца.Если пропущен один или несколько приемов препарата, необходимо продолжать применение препарата в обычном режиме и в обычной дозе.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата,Детский возраст до 18 лет (опыт применения ограничен),Беременность (I триместр) и период лактации (опыт применения ограничен).

Применение при беременности и кормлении грудью

Опыт применения препарата у беременных ограничен. О каких-либо нежелательных реакциях при применении диосмина у беременных в клинической практике не сообщалось. В экспериментальных исследованиях не было выявлено тератогенного воздействия диосмина на течение беременности, эмбриофетальное и постнатальное развитие. Тем не менее, по соображениям безопасности не рекомендуется применять препарат в I триместре беременности. Во время II и III триместра беременности рекомендуется применять препарат с осторожностью.Во время грудного вскармливания прием препарата не рекомендуется, т.к. отсутствуют данные о проникновении препарата в грудное молоко.

Побочные действия

Частота побочных эффектов определена в соответствии с классификацией ВОЗ нежелательных лекарственных реакций по частоте возникновения: очень часто - более 1/10, часто - более 1/100 и менее 1/10, нечасто - более 1/1000 и менее 1/100, редко - более 1/10000 и менее 1/1000, очень редко - менее 1/10000, включая единичные случаи.Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто - тошнота, рвота, диарея, диспептические расстройства, изжога, запор.Со стороны центральной нервной системы: редко - головная боль, недомогание, головокружение.Со стороны кожи и подкожной жировой клетчатки: редко - высыпания, зуд,Аллергические реакции: редко - крапивница.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны. Учитывая широкий терапевтический диапазон диосмина, риск интоксикации при передозировке представляется незначительным. Специфический антидот неизвестен.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимые взаимодействия диосмина с другими не описаны.

Особые указания

Лечение острого геморроя проводят в комплексе с другими препаратами. При отсутствии быстрого клинического эффекта рекомендуется проконсультироваться с проктологом, при необходимости провести дополнительное обследование и скорректировать проводимую терапию.Опыт применения диосмина у детей младше 18 лет недостаточен.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.