Инструкция по применению
Флебопресс капсулы 300 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Троксерутин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 300 мг



Описание

Капсулы твердые желатиновые № 0. Корпус светло-желтого цвета с коричневатым оттенком, крышечка светло-фиолетового цвета, непрозрачные. Содержимое капсул: гранулированный порошок или смесь порошка и гранул от желтого до зеленовато-желтого цвета, допускается уплотнение содержимого капсулы в комки.

Действующее вещество

Троксерутин

Состав

На 1 капсулу: Действующее вещество: троксерутин - 300,00 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 39,50 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 7,00 мг, магния стеарат - 3,50 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Троксерутин быстро всасывается при приеме препарата внутрь. Максимальная концентрация троксерутина в плазме крови (Смах) устанавливается в среднем через 1,75 ± 0,46 часа после приема внутрь. Абсорбция составляет примерно 10-15 %. Биодоступность препарата возрастает с увеличением дозы. Период полувыведения (T1 /2) составляет 6,77 ± 2,37 часа. Терапевтическая концентрация препарата в плазме крови сохраняется в течение 8 часов. Через 30 часов после приема троксерутина наблюдается второй максимум концентрации препарата в плазме крови, обусловленный энтерогепатической рециркуляцией. Частично Метаболизируется в печени с образованием глюкуронида и тригидроэтилкверцитина. Выводится в основном через кишечник (до 65-70 %), меньшая часть (до 25 %) препарата выводится в неизмененном виде почками.

Показания

Препарат Флебопресс® капсулы 300 мг применяется в составе комплексной терапии указанных заболеваний: • хроническая венозная недостаточность, • трофические нарушения при хронической венозной недостаточности и трофические язвы, • варикозное расширение вен, • поверхностный тромбофлебит, перифлебит, • посттромботический синдром, • посттравматический отек и гематомы мягких тканей, • в качестве вспомогательного лечения после склеротерапии и/или удаления варикозно расширенных вен нижних конечностей, • геморрой (для облегчения симптомов), • диабетическая ангиопатия, ретинопатия.

Способ применения и дозы

Внутрь. Капсулы следует проглатывать целиком, во время еды, запивая достаточным количеством воды. На начальном этапе лечения назначают по 1 капсуле (300 мг) 3 раза в сутки. Эффект обычно развивается в течение 2 недель. Далее лечение продолжают в той же дозе или снижают до средней терапевтической дозы - 1 капсула 2 раза в сутки (600 мг), или приостанавливают (при этом достигнутый эффект сохраняется на протяжении не менее 4 недель). В случае необходимости дозу можно увеличить, после консультации с врачом. Курс лечения составляет в среднем 3-4 недели. Для поддерживающей терапии достаточно приема 1 капсулы (300 мг) в сутки в течение 3-4 недель. При диабетической ретинопатии Флебопресс® назначают по 2 капсулы (разовая доза 600 мг) 3 раза в сутки (суточная доза 1,8 г). В среднем длительность терапевтического курса составляет 3-4 недели. Необходимость более длительного лечения определяется после консультации с врачом и индивидуально.

Противопоказания

• Повышенная чувствительность к троксерутину и другим компонентам препарата, • язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит в фазе обострения, • непереносимость лактозы, недостаточность лактазы или синдром глюкозогалактозной мальабсорбции, • беременность (I триместр), • период грудного вскармливания, • детский возраст до 18 лет (опыт применения ограничен). С осторожностью: • Хроническая почечная недостаточность (при длительном применении).

Побочные действия

Троксерутин очень хорошо переносится, в редких случаях возникают легкие нежелательные реакции. Нарушения со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности. Нарушения со стороны нервной системы: головная боль. Нарушения со стороны сосудов: «приливы» крови к лицу. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боль в желудке, метеоризм, диарея, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: эритема, кожный зуд, кожная сыпь. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу!

Передозировка

Симптомы. Троксерутин обладает очень низкой токсичностью. При передозировке возможно появление следующих симптомов: возбуждение, тошнота, головная боль, «приливы» крови к лицу. Лечение. Необходимо промыть желудок, принять активированный уголь (в течение часа после приема). При необходимости проводят симптоматическое и поддерживающее лечение. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении усиливает действие аскорбиновой кислоты на резистентность и проницаемость сосудистой стенки.

Особые указания

Опыт применения препарата Флебопресс® у детей в возрасте младше 18 лет недостаточен. При лечении поверхностного тромбофлебита или тромбоза глубоких вен применение препарата не исключает необходимость назначения средств противовоспалительной и противотромботической терапии. Флебопресс® неэффективен при отеках, вызванных сопутствующими заболеваниями печени, почек и сердца. При самостоятельном применении препарата не следует превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы. Если в период применения препарата выраженность симптомов заболевания не уменьшается или симптомы заболевания утяжеляются, следует немедленно обратиться к врачу. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Прием препарата Флебопресс® не оказывает влияния на двигательные и психические реакции, не препятствует управлению транспортными средствами и другими сложными механизмами.

Срок хранения после открытия

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.