Инструкция по применению
Мазь Флеминга 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Однородная мазь от белого до белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом ментола.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Состав (на 100 г):Активные компонентыCalendula officinalis (Calendula) (Календула оффициналис (Календула)) D1 1,76 г, Hamamelis virginiana (Hamamelis) (Гамамелис виргиниана (Гамамелис)) D1 1,76 г, Aesculus hippocastanum (Aesculus) (Эскулюс гиппокастанум (Эскулюс)) D1 1,76 г, Левоментол 0,64 г, Цинка оксид 9,4 г. Вспомогательное веществоВазелин до 100 г.Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено активными компонентами, входящими в его состав.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Наружный геморрой (неосложненные формы).Аллергический дерматит.Вазомоторный ринит.

Способ применения и дозы

При геморрое мазь наносить 1–3 раза в сутки с помощью ватного тампона.Курс лечения 5–7 дней. Повторение курса — после консультации с врачом.При рините мазью смазывать слизистые оболочки носа или турунды с мазью закладывать в носовые ходы на 5–7 минут 2–3 раза в день.Курс лечения 7–10 дней.При аллергическом дерматите мазь наносить на болезненные участки кожи 2 раза в день. Курс лечения 10–14 дней.Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, при назначении и под наблюдением врача, в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки до настоящего времени не было зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает возможность лечения другими лекарственными средствами.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы («первичное ухудшение»). В этом случае следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмамиПрименение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.