Инструкция по применению
Флидарин таблетки10мг N20



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Россия
Производитель: Натива
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Флударабин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Флударабин

Состав

Флударабина фосфат 10 мг Вспомогательные вещества: алюмометасиликат магния - 4 мг, кроскармеллоза натрия - 4.5 мг, кремния диоксид коллоидный - 3 мг, магния стеарат - 1.5 мг, лудипресс - 127 мг (лактозы моногидрат - 118.1 мг, повидон К30 - 4.45 мг, кросповидон - 4.45 мг). Состав оболочки: опадрай II белый 85F48105 - 6 мг (спирт поливиниловый - 46.9%, тальк - 17.4%, макрогол 3350 - 23.6%, титана диоксид - 12.1%).

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

Хронический лимфоцитарный В-клеточный лейкоз (ХЛЛ) у пациентов с достаточными запасами костного мозга.

Способ применения и дозы

Флударабин фосфат следует вводить только в/в. Не получено ни одного сообщения о случае внесосудистого введения флударабина, которое могло бы привести к серьезным местным побочным реакциям. Однако необходимо избегать случайного внесосудистого проникновения. Рекомендованная доза составляет 25 мг/м2 поверхности тела ежедневно в течение 5 последовательных дней каждые 28 дней.

Противопоказания

Выраженные нарушения функции почек (КК меньше 30 мл/мин) . декомпенсированная гемолитическая анемия . беременность . период лактации, повышенная чувствительность к флударабина фосфату.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны системы кроветворения: нейтропения, тромбоцитопения, анемия. Со стороны пищеварительной системы: анорексия, тошнота, рвота, изменения активности ферментов печени и поджелудочной железы. Со стороны обмена веществ: при синдроме лизиса опухоли - гиперурикемия, гиперфосфатемия, гипокальциемия, метаболический ацидоз, гиперкалиемия. Со стороны мочевыделительной системы: при синдроме лизиса опухоли - гематурия, уратная кристаллурия, почечная недостаточность, отеки . редко - геморрагический цистит. Со стороны дыхательной системы: диспноэ, кашель, интерстициальная легочная инфильтрация, пневмония. Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: редко - слабость, ажитация, нарушения сознания, расстройства зрения . в единичных случаях - периферическая невропатия, кома. Со стороны репродуктивной системы: азооспермия, аменорея. Аллергические реакции: кожная сыпь, синдром Лайелла. Прочие: развитие инфекционных осложнений, лихорадка, озноб, утомляемость.

Особые указания

Со стороны системы кроветворения: нейтропения, тромбоцитопения, анемия. Со стороны пищеварительной системы: анорексия, тошнота, рвота, изменения активности ферментов печени и поджелудочной железы. Со стороны обмена веществ: при синдроме лизиса опухоли - гиперурикемия, гиперфосфатемия, гипокальциемия, метаболический ацидоз, гиперкалиемия. Со стороны мочевыделительной системы: при синдроме лизиса опухоли - гематурия, уратная кристаллурия, почечная недостаточность, отеки . редко - геморрагический цистит. Со стороны дыхательной системы: диспноэ, кашель, интерстициальная легочная инфильтрация, пневмония. Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: редко - слабость, ажитация, нарушения сознания, расстройства зрения . в единичных случаях - периферическая невропатия, кома. Со стороны репродуктивной системы: азооспермия, аменорея. Аллергические реакции: кожная сыпь, синдром Лайелла. Прочие: развитие инфекционных осложнений, лихорадка, озноб, утомляемость.

Условия хранения

В сухом месте