Инструкция по применению
Флюдитек Сироп 5 % 125 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Франция
Производитель: Innothera Chouzy
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Карбоцистеин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%
Срок годности: 24

Действующее вещество

Карбоцистеин

Состав

Карбоцистеин (Carbocisteine) 50 мг/мл

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

ВсасываниеПосле приема внутрь Cmax в сыворотке крови и в слизистой оболочке дыхательных путей достигается через 2-3 ч после приема внутрь и сохраняется в слизистой оболочке в течение 8 ч.ВыведениеВыводится преимущественно с мочой, частично - в неизмененном виде, частично - в виде метаболитов.

Показания

Острые и хронические бронхолегочные заболевания, (трахеит, бронхит, трахеобронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) и воспалительные заболевания полости носа, носоглотки, околоносовых пазух и среднего уха (ринит, аденоидит, синусит, средний отит), сопровождающиеся образованием вязкого, трудноотделяемого секрета (мокроты, слизи); подготовка к бронхоскопии и/или бронхографии.

Способ применения и дозы

Для приема внутрь. По 15 мл 3 раза в день, желательно за 1 час до еды или через 2 часа после еды. Лечение не должно продолжаться более 8-10 дней без консультации с врачом.15 мл сиропа содержит 750 мг карбоцистеина.

Противопоказания

повышенная чувствительность к карбоцистеину или другим компонентам препарата; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; хронический гломерулонефрит (в фазе обострения), цистит;детский возраст до 15 лет; беременность (I триместр).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Флюдитек сироп 50 мг/мл в I триместре беременности противопоказано.С осторожностью следует назначать Флюдитек сироп 50 мг/мл во II и III триместрах беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастрии, метеоризм, желудочно-кишечное кровотечение, головокружение, слабость, недомогание, в единичных случаях - аллергические реакции (зуд, крапивница, экзантема, ангионевротический отек).Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: гастралгия, тошнота, диарея.Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении Флюдитек повышает эффективность глюкокортикостероидной (взаимно) и антибактериальной терапии воспалительных заболеваний верхних и нижних отделов дыхательных путей.При одновременном применении Флюдитек усиливает бронхолитический эффект теофиллина.Активность карбоцистеина ослабляют противокашлевые и атропиноподобные средства.

Особые указания

Больным сахарным диабетом или находящимся на низкоуглеводной диете следует принимать во внимание, что 1 столовая ложка сиропа 50 мг/мл содержит 5.25 г сахарозы.Флюдитек в форме сиропа 50 мг/мл предназначен только для взрослых и детей старше 15 лет.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиНет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Условия хранения

В сухом месте