# Инструкция по применению
# Флюкорем Гель 0,5 % 15 г

## Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Индия
Производитель: С Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Флуконазол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.5%
Срок годности: 36.0




## Действующее вещество

Флуконазол

## Состав

1 г. геля содержит:Активное вещество: флуконазол- 5,0 мгВспомогательные вещества: пропиленгликоль - 10 мг, метилпарагидроксибензоат -1,8 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0,2 мг, динатрия эдетат - 0,5 мг, макрогол 400 -50 мг, карбомер - 10 мг, диэтиламин до pH 6,0 - 7,0, вода очищенная до 1,00 г.

## Форма выпуска

Гель

## Фармакокинетика

При наружном применении практически не всасывается с поверхности кожи и не обладает системным действием

**Показания**

Криптококкоз, включая криптококковый менингит и инфекции другой локализации (например, легких, кожи), в т.ч. у больных с нормальным иммунным ответом и у больных СПИД, реципиентов пересаженных органов и больных с другими формами иммунодефицита; поддерживающая терапия с целью профилактики рецидивов криптококкоза у больных СПИД.Генерализованный кандидоз, включая кандидемию, диссеминированный кандидоз и другие формы инвазивной кандидозной инфекции, такие как инфекции брюшины, эндокарда, глаз, дыхательных и мочевых путей, в т.ч. у больных со злокачественными опухолями, находящихся в ОИТ и получающих цитотоксические или иммуносупрессивные средства, а также у больных с другими факторами, предрасполагающими к развитию кандидоза.Кандидоз слизистых оболочек, включая слизистые оболочки полости рта и глотки, пищевода, неинвазивные бронхолегочные инфекции, кандидурия, кожно-слизистый и хронический атрофический кандидоз полости рта (связанный с ношением зубных протезов), в т.ч. у больных с нормальной и подавленной иммунной функцией; профилактика рецидива орофарингеального кандидоза у больных СПИД.Генитальный кандидоз; острый или рецидивирующий вагинальный кандидоз; профилактика с целью уменьшения частоты рецидивов вагинального кандидоза (3 и более эпизодов в год); кандидозный баланит.Микозы кожи, включая микозы стоп, тела, паховой области, отрубевидный лишай, онихомикозы и кожные кандидозные инфекции. Глубокие эндемические микозы у больных с нормальным иммунитетом, кокцидиоидомикоз, паракокцидиоидомикоз, споротрихоз и гистоплазмоз. Профилактика грибковых инфекций у больных со злокачественными опухолями, предрасположенных к развитию таких инфекций в результате цитотоксической химиотерапии или лучевой терапии

**Способ применения и дозы**

Флюкорем применяют наружно: на пораженный участок кожи наносят гель тонким ровным слоем, захватывая также на 2 см и примыкающую к ним область, и втирают до полного впитывания 2 раза в сутки (утром и вечером). Длительность применения составляет 1 - 3 недели в зависимости от возбудителя инфекции и места ее проявления. При некоторых резистентных формах длительность применения может быть продлена до 6 недель по рекомендации врача

**Противопоказания**

Пповышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к другим азольным соединениям в анамнезе

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказано

**Побочные действия**

Редко могут наблюдаться местные реакции: раздражение кожи, чувство жжения. Возможны аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь)

**Передозировка**

Нет сведений

**Взаимодействие с другими препаратами**

Клинически значимое лекарственное взаимодействие Флюкорема с другими лекарственными препаратами не установлено

**Особые указания**

Препарат не предназначен для применения в офтальмологии. Следует избегать попадания препарата в глаза. При отсутствии эффекта от терапии в указанные сроки необходимо пересмотреть диагноз. При появлении первых симптомов повышенной чувствительности или раздражении кожи препарат необходимо отменить. Без консультации врача не применять с другими лекарственными препаратами для местного применения. Флюкорем не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу, требующую повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций

**Условия хранения**

Беречь от детей